

Haziran ayının son on gününde, bahar ürünlerinin vejetasyonu yüksek sıcaklıklar ve toprak nemi açığı altında ilerleyecek

Автор(и): Растителна защита

Дата: 24.06.2025 Брой: 6/2025



Haziran ortasında bazı güney bölgelerde 35-36°'yi bulan ve aşan yüksek sıcaklıkların ardından, agrometeorolojik koşullarda herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Dönem başında beklenen yağışların ekonomik önemi olmayacaktır. Haziran ayının ilk ve ikinci on günlük dönemlerinde normalin altında yağışlar ve normalin üzerinde sıcaklıklar nedeniyle, ilkbahar ekinleri için toprak nemi rezervleri önemli ölçüde azaldı. Bazı güney bölgelerde, mısır ve ayçiçeği için 50 cm'lik katmandaki nem rezervlerinin seviyesi yaz başlangıcı için alışılmadık derecede düşük - tarla kapasitesinin %60'ının altında.

Önümüzdeki dönemin çoğu gününde, ilkbahar ekinlerinin gelişimi Haziran ayının üçüncü on günlük dönemi için iklim normlarına yakın ve üzerinde sıcaklıklarda, birçok tarla bölgesinde ise toprak nemi eksikliği ile devam edecektir. Bu, yaz aylarında keskin bir kuraklık yaşanan art arda üçüncü yıldır ve bu durum mısır ve ayçiçeği ekinleri için zararlıdır.

Dönem boyunca ayçiçeklerinde çiçeklenme oluşumu gözlemlenecektir.



Gri mısır hortumlu böceğinin saldırısı ilkbahar ekinleri için özellikle tehlikelidir. Tarım Enstitüsü – Şumen'den bilim insanları, Veliko Tarnovo, Targovişte, Rusçuk, Razgrad ve Şumen bölgelerindeki mısır ve ayçiçeği tarlalarında bir araştırma yaparak zararlının neden olduğu önemli hasarları tespit etti.

Mısırdaki yaprak oluşumu gerçekleşecektir. Haziran sonunda, erkenci mısır hibritlerinde püskül çıkarma fazının başlangıcı gözlemlenecektir.

Mısır Zararlıları

Haziran ayının üçüncü on günlük döneminde, en tehlikeli zararlılardan biri olan Avrupa mısır kurdunun varlığına yönelik mısır ekinlerinin denetimi devam etmeli ve eğer sayılar ekonomik eşiği (100 bitki başına 10 yumurta paketi) aşarsa, larvalar saplara girmeden önce onlara karşı bir insektisit uygulaması gereklidir.

Аврупа Мисир Курду (*Ostrinia nubilalis* Hübner) – Мисирин Önemli Bir Ekonomik Zararlısı

Dönem boyunca tarla bölgelerindeki buğdayda balmumu ve tam olum görülecektir. Yüksek rakımlı tarlalardaki ürünler için süt olumu ve balmumu olumuna geçiş gerçekleşecektir.

Yüksek maksimum sıcaklıklar ve tahıl hasadı sırasında yangın riski tahmin edilmektedir.