

Теммуз ayında, aşırı yüksek sıcaklıklarla birlikte kuru ve sıcak hava, tarım bitkilerindeki fizyolojik süreçlerin normal seyrini bozacaktır.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 09.07.2025 Брой: 7/2025



Теммуз ayında tarımsal ürünlerin gelişimi, iklim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarda ilerleyecek. İlkbahar ekili ürünlerin vejetasyonu için belirleyici faktör, yaz başında keskin bir şekilde azalan toprak nem rezervleri olacak. Kuzeybatı Bulgaristan'ın bazı yerlerinde (Buzovets tarım istasyonu) ve güney bölgelerde, 50cm toprak katmanında nem bulunmamakta, 100cm katmanda ise nem rezervleri seviyesi düşük - Tarla Kapasitesinin %60'ının altında.

Теммуз için normalin altında yağış da öngörülmekte olup, toprak nem açığı derinleşecek ve tarımsal ürünler için uygun bir sulama rejiminin uygulanmasını gerektirecektir.

Nispeten kuru ve sıcak, aşırı yüksek sıcaklıkların öngörüldüğü Temmuz ayının ikinci ve üçüncü on günlük dönemlerinde, ilkbahar ekili ürünler için artırılmış sulama normları gerekli olacaktır.

Aşırı sıcaklar ve yağış eksikliği, ilkbahar ekili ürün hasadı için ciddi bir tehdit oluşturuyor

Ay boyunca, mısırdaki erkenci olmasına bağlı olarak çeşitli fenolojik evreler gözlenecektir. İlk on günde, daha erkenci hibritlerde tepe püskülü çıkarma, çiçeklenme ve koçan püskülü oluşumu gerçekleşirken, üçüncü on günün sonuna doğru bazı ekimlerde süt olumu evresi gözlenecektir.

Ayçiçeği, çiçeklenme, döllenme ve tohum doldurma evrelerinden geçecektir. Ay sonuna doğru, Tuna Ovası'nın bazı kısımlarında ve güneydoğu bölgelerdeki ekimlerde olgunlaşma evresinin başlangıcı gözlenecektir.



Temmuz ayında öngörülen 38-40°C üzerindeki yüksek maksimum sıcaklıklar, ayçiçeği ve mısırdaki çiçeklenme ve döllenme üzerinde olumsuz bir etki yapacak, tarımsal ürünlerdeki fizyolojik süreçlerin normal seyrini bozacaktır. 35°C üzerinde, ayçiçeğinde tozlaşma süreci durur.

Temmuz ayının ilk on günündeki kuru ve sıcak hava, Tuna Ovası'nın bazı kısımlarında (Nova Selo, Sviştov, Rusçuk, Silistre) maksimum sıcaklıkların 40 – 42°C'ye ulaşmasıyla, yağmura bağlı koşullarda yetiştirilen bazı ilkbahar ekili ürünlerin hayatta kalmasını sorgulanır hale getirmektedir. Kuzeydoğu Bulgaristan'ın bazı yerlerinde (Şumnu, Rusçuk, Silistre, Provadiya, Preslav) ve güney bölgelerde, mısır ve ayçiçeği ciddi şekilde bozulmuş turgor gösteriyor ve bazı ekimlerde bitkilerin alt katmanlarındaki yapraklarda sararma ve kuruma gözlemleniyor.

Temmuz ayının ikinci on gününde batı bölgelerde yağış beklenmektedir, ancak derinleşen kuraklık arka planında, toprak nem açığını gidermek için son derece yetersiz olacaktır. Uygun bir sulama rejiminin uygulanması, tarımsal ürünler için öncelikli bir önlem olarak kalmaya devam etmektedir.



Ay boyunca meteorolojik koşullar, meyve ağaçları, asmalar ve sebze bitkilerindeki külleme hastalıkları hariç, bir dizi fungal hastalığın gelişimini sınırlandıracaktır. İlkbahar donlarından etkilenmemiş meyve ürünleri için meyve kurtlarının ikinci nesline karşı mücadeleye devam edilmeli, asmalar için ise – salkım güvesinin ikinci nesil tırtıllarına karşı mücadele yapılmalıdır. Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlamalar, günün daha serin saatlerinde yapılmalıdır.



Artmış yangın tehlikesi koşullarında, Temmuz ayında buğday hasadı devam etmektedir.

Resmi veriler, Dobriç bölgesinde buğday hasadının ilk aşamada olduğunu göstermektedir, ancak ilkbaharın değişkenliğine ve süregelen kuraklığa rağmen, bölgedeki çiftçiler başarılı bir kampanya umut etmektedir. Şu anda, toplam 1.298.724 dekar ekili alandan sadece 95.630 dekar hasat edilmiş olup, bu toplam ekili alanın yaklaşık %7,4'ünü temsil etmektedir. Şu ana kadar 58.201 ton buğday üretilmiş olup ortalama verim dekar başına 608,6 kilogramdır.

Bugüne kadarki en yüksek verimler, dekar başına 684 kg ile General Toşevo belediyesinde bildirilmiş, onu dekar başına 649,7 kg ile Kruşari belediyesi ve dekar başına 630 kg ile Balçık ve Kavarna belediyeleri izlemiştir.

Dobruca Tarım Enstitüsü'nün tarlalarında da hasat tüm hızıyla devam etmekte ve geçen yıla kıyasla daha iyi bir verim beklenmektedir.

İyi sonuçlarda seleksiyon büyük bir rol oynamaktadır, diyor Enstitü Müdürü Doç. Dr. İliya İliev. Ayrıca, bu yıl enstitü toprak sağlığını iyileştirmek için ek ürünlerle toprak koşullarını iyileştirmeye yönelik bir programa katıldı ve bunun da bir etkisi var. Ve ürünler için dengeli beslenme de dahil edildiğinde, sonuçlar gecikmez.

Ülkede arpa hasadı neredeyse tamamlanmış olup, Doğu Bulgaristan'ın bazı kısımlarında arpadan elde edilen verimler dekar başına 600 kg'ın üzerindedir (Silistre tarım istasyonu - dekar başına 700 kg).

Aromatik bitkinin en geniş alanlarının General Toşevo'da – 8.000 dekarın üzerinde – bulunduğu lavanta hasadı ay boyunca devam etmektedir. Şu anda oradaki verim dekar başına yaklaşık 300 kg civarındadır. Kampanya Kazanlık ve Pavel Banya'da da ortalama dekar başına 280 ila 320 kg verimle başlamıştır.