


Ağustos ayında geç tarım ürünlerinin gelişimi için sınırlayıcı faktör, toprak nemi açığı olmaya devam etmektedir

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.08.2025 Брой: 8/2025



Ağustos ayında tarımsal meteorolojik koşullar, iklim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve aylık norm civarında veya altında yağışlar tarafından belirlenecek. Toprak nemi eksikliği, Ağustos ayında da geç tarım ürünlerinin gelişimi için sınırlayıcı bir faktör olmaya devam edecek.

Temmuz sonunda, derinleşen kuraklığı takip eden yağışlar yerel ve geç tarım ürünlerindeki nem açığını gidermek için yetersiz kaldı. Tarla bölgelerinin çoğunda, 50 ve 100 cm toprak katmanlarında yararlı nem bulunmamaktadır.

Ağustos ayının çoğu günü için öngörülen nispeten kuru hava koşulları, ikinci ürünler ve geç mısır hibritleri için artırılmış sulama normlarının uygulanmasını gerektirecektir. Gelecek yıl için çiçek tomurcuklarını oluşturma sürecindeki meyve ağaçları için de artırılmış sulama normları gerekli olacaktır.

DAI'den yeni nesil ayçiçeği hibritleri, verim yönetimi için oldukça yoğun bir formattır

Ağustos ayında, ülke için alışlagelmiş zaman dilimlerinden daha erken olarak, geç ilkbahar ürünlerinin gelişimi tamamlanacak. Ağustos başında, Güney Bulgaristan'daki ayçiçeği ekimlerinde teknik olgunluk gözlenecek (Filibe, Hasköy, Sliven, Yanbol), ve ilk on günün sonu ile ikinci on günün başında - tarla bölgelerinin büyük bir kısmındaki ekim alanlarında da. Sulama koşullarında yetiştirilen erkenci mısır hibritleri ilk on günlük dönemde balmumu ve tam olgunluğa girecek. Orta-geç hibritler ise gelişimlerini Ağustos'un üçüncü on günlük döneminde tamamlayacak.

Yazın ilk yarısındaki uzun süreli kuraklık ve aşırı yüksek sıcaklıklarla karakterize olan olumsuz tarımsal meteorolojik koşullar nedeniyle, mısır ve ayçiçeğinde düşük verim beklenmektedir.

Temmuz ayında devam eden ve Ağustos'ta da sürececek olan kalıcı yüksek sıcaklıklar, ilkbahar ürünlerinin hasadını ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Ülkedeki tek ayçiçeği ıslah merkezi olan Dobruca Tarım Enstitüsü'nde, ıslah çalışmaları canavar otu, mildiyö ve kuraklığa dayanıklı yeni ayçiçeği çeşitleri oluşturmaya odaklanmıştır. Enstitünün "Express" teknolojisi kullanılarak yetiştirilmeye uygun ve 731 ırkına kadar mildiyöye ve G ırkına kadar canavar otuna dayanıklı yeni hibritlerinden biri olan "Dara", kuraklık ve yüksek sıcaklık koşullarında oldukça iyi performans göstermektedir.

Ağustos ayında maksimum sıcaklıkların 35–40°C aralığında olması öngörülüyor. Bu değerler, geç üretim sebzelerinde (salatalık, taze fasulye, kabak) çiçeklenme ve döllenme üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacaktır.

Ay boyunca hakim olacak meteorolojik koşullar, sebze ürünleri, meyve ağaçları ve asmalardaki küllemeler hariç, mantar hastalıklarının gelişimini sınırlandıracaktır. Akar popülasyonlarında bir artış beklenmektedir. Bağlarda, üçüncü nesil bağ salkım güvesi tırtıllarının yoğunluğunun izlenmesi gerekmektedir. Gerektiğinde, Ağustos ayındaki bitki koruma ilaçlamaları, ürünlerin olgunlaşma dönemine uygun olarak, hasat öncesi bekleme süresi uygun ürünler kullanılarak, günün daha serin saatlerinde (25°C altındaki sıcaklıklarda) yapılmalıdır.

Kaynak: NIMH