

Eylül ayında tarımsal açıdan önemli bir yağış beklenmemekte olup, koşullar geç sebze ürünlerinden ek verim oluşumuna imkan sağlayacaktır.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.09.2025 *Брой:* 9/2025



Eylül ayında tarımsal meteorolojik koşullar, iklim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve aylık norm civarında ve altında yağışlar ile belirlenecek.

Derinleşen kuraklığın ardından, Ağustos sonundaki yağışlar yerel oldu ve sadece orta ve doğu bölgelerdeki belirli yerlerde üst toprak katmanını

nemlendirdi. Ekilebilir bölgelerin çoğunda, 50 ve 100 cm toprak katmanlarında verimli nem bulunmamaktadır.

Eylül ayının birinci ve ikinci on günlük dönemlerinde tarımsal açıdan önemli yağış beklenmemekte olup, ekilebilir bölgelerin birçok yerinde kuru ve sıkışmış toprak, kanola ekimi için ayrılan alanlarda derin sürüm ve ekim öncesi toprak işleme çalışmalarının yapılmasını zorlaştıracaktır. Hassas tarım teknikleri gerektiren bu yağlı tohumlu bitkinin ekiminde ciddi gecikmeler yaşanma olasılığı yüksektir. Kanola ekimi için tarımsal teknik dönem, Ağustos sonundan Eylül ayının ikinci on günlük döneminin sonuna kadardır.



Eylül ayında, normallerin üzerinde seyretmesi öngörülen termal koşullar, uzun süren yaz kuraklığının olumsuz etkilerini atlatmış olan geç tarım ürünlerinin gelişiminin son aşamalarını hızlandıracaktır. Ayın başında, sulu koşullarda yetiştirilen orta-geçci mısır hibritleri balmumu ve tam olgunlukta olacakken, geçci hibritler süt olumundan balmumu olumuna geçiş aşamasında olacaktır.

Ayın çoğu günü için öngörülen nispeten kuru ve ılık yaz sonu ve sonbahar başı havası, üzüm hasadı için uygun koşullar sağlayacaktır. Yaz sıcaklıklarının

normallerin üzerinde seyretmesi sonucunda, geçci şaraplık üzüm çeşitleri teknolojik olgunluğa her zamanki tarihlerden daha erken ulaşacaktır.

Eylül ayındaki meteorolojik koşullar, külleme hastalıkları hariç olmak üzere fungal hastalıkların gelişimini sınırlandıracaktır. Açık tarlada geç üretim yapılan sebze bitkilerinde, sebze verimine zarar veren ve kalitesini düşüren akarlar, lahana güvesi ve pamuk yeşilcurdu'na karşı bitki koruma ilaçlamaları hafife alınmamalıdır.

Ay boyunca, meyve bitkilerindeki zararlıların büyük bir kısmının zararlı faaliyeti sona ermektedir. Eylül sonunda, armut bahçelerinin armut tomurcuk hortumlu böceği varlığı açısından kontrol edilmesi tavsiye edilir. Bu zararlıya karşı mücadele, sadece sonbahar başında erginlere karşı etkilidir. Zararlı yoğunluğu ekonomik zarar eşiğini (ağaç başına 3 böcek) aştığında, ilaçlama yapılmalıdır.

Yaz sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi sonucunda, ilkbahar donlarından etkilenmemiş erkenci sonbahar meyve ağacı çeşitlerinin bir kısmı hasat olgunluğuna ulaşacaktır (elma: Golden Parmena, Jonathan, Red Delicious, Golden Delicious, Canadian Reinette, vb.).

Eylül ayında kritik minimum sıcaklıklar beklenmemekte olup, koşullar dona hassas geçci sebze bitkilerinden ek üretim oluşumuna izin verecektir.