

Meyve Bahçesinde Eylül ve Ekim Aylarında

Автор(и): проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил

Дата: 28.09.2015 Брой: 9/2015



Elma ağaçları için bu dönemde, elma içkurdu ikinci nesline karşı ve gerekirse kabuklu bit ve meyve çürüklüğü patojenlerine karşı ilaçlama yapılır.

Elma içkurdu mücadelesi için onaylı insektisitler listesi **şunları içerir**: Afirm 095WG - %0.3, Vaztak Nov 100EC – %0.0125, Voliam Targo 063SC – 75 ml/da, Decis 2.5EC – %0.03, Dikline 2.5EC – %0.03, Deca EC – %0.03, Dursban 4E – %0.2, Nexid 015CS – %0.03, Sumi Alpha 5EC – %0.02, Karate Zeon 5CS – %0.02, Karate Express WG – 60-100 g/da, Calypso 480SC – %0.02, Coragen 20SC - %0.016 Reldan 40EC – %0.12, Pirinex 48EC – %0.12, Sineis 480SC – 20 – 37.5 ml/da, Supersect Mega – %0.015, Efcimetrin 10EC - %0.03, Cyclone 10EC – 30 ml/da, Cyperfor 100EC – 30 ml/da, Sherpa 100EC – %0.03. Yaprak galeri güvesi zararı tespit edilen bahçelerde de mücadele yapılmalıdır. Dursban 4E – %0.2, Sumi Alpha 5EC – %0.02, Karate Express WG – 60-

100 g/da, Calypso 480SC – %0.02 ve Sineis 480SC – 20 – 37.5 ml/da insektisitleri elma içkurdu ve yaprak galeri güvelerine karşı eşzamanlı mücadelede kullanılabilir.

Meyveleri *Monilinia*, *Penicillium*, *Botrytis*, *Alternaria*, *Botryosphaeria*, vb. cinslerinden mantarların neden olduğu kabuklu bit ve meyve çürüklüğü patojenlerinin geç enfeksiyonlarından korumak için insektisit çözültisine Luna Experience – 20–75 ml/da fungisiti eklenmelidir. Meyveleri Eylül ayının ikinci yarısında hasat edilecek elma çeşitleri, hasat öncesi bekleme süresi kısa olan insektisitlerle ilaçlanmalıdır.

Geç olgunlaşan **armut çeşitleri** için, meyve kurtları/elma içkurdu, doğu meyve güvesi, armut kurdu ve meyve çürüklüğü patojenlerine karşı mücadeleye devam edilmelidir. Elmalar için belirtilen insektisitler ve fungisitler kullanılır.

Armut yaprakbiti (psyllid) yoğunluğu yüksek seyrederse /kolonili sürgün oranı %4-6/, armut plantasyonları Decis 2.5 EC – %0.03, Decis 100EC – 12.5 ml/da, Deca EC – 30-50 ml/da, Karate Express WG – 60-80 g/da, Vaztak Nov 10 EC – %0.02, Sineis 480SC – 37.5 ml/da, Sumi Alpha 5EC – %0.03 ile ilaçlanır.

Düzenli zararlı mücadelesi yapılmamış armut bahçelerinde, armut tomurcuk güvesi genellikle çoğalır ve yoğunluğu sıklıkla ekonomik zarar eşiği olan ağaç başına 5-8'i aşar, bu da yumurta bırakmadan önce erginlere karşı Dursban 4E – %0.15 veya Vaztak Nov 100EC – %0.0125 ile ilaçlama yapılmasını gerektirir.

Ülkemizde yetiştirilen **ayva** çeşitlerinin meyveleri, geç kahverengi çürüklük, gri küf ve yumuşak çürüklüğe karşı oldukça hassastır; bu hastalıklar özellikle meyve olgunlaşması sırasında ve sonrasında depolama döneminde sık yağışlarda çok zararlı olur. Bu da Luna Experience – 20 – 75 ml/da veya Topsin M 70WDG – %0.12 ile ilaçlama yapılmasını gerektirir. Meyveleri elma içkurdu ve doğu meyve güvesi istilasından korumak için, fungisit çözültisine elma içkurdu mücadelesi için belirtilen insektisitlerden biri eklenir.