

'Ekim ayında: Agrometeorolojik koşullar nasıl olacak ve optimal ekim tarihleri ne zaman'

Растителна Защита

Tarih 09.10.2026 | Sayı 10/2026 | ISSN 2815-522X | Dil TR
www.plant-protection.com/article/2478?lang=tr



Ekim ayının ilk on gününde, agrometeorolojik koşullar istikrarsız hava ve iklim normlarının etrafında ve altında seyreden ortalama günlük sıcaklıklar tarafından belirlenecektir. Dönemin çoğu gününde tahmin edilen serin ve yağışlı hava, patojenlerin gelişimi için bir ön koşul olacaktır - meyve ağaçlarının sonbahar çeşitlerinin meyvelerinde geç kahverengi çürüklük (*Monilia fructigena*), hasat edilmemiş üzüm mahsulünde gri küf (*Botrytis cinerea*). On günlük dönemin sonunda kitlesel don olayları beklenmektedir, bu da dona maruz kalan sebze mahsullerinin zamanında hasat edilmesini gerektirmektedir.



*Meyve ağaçlarının sonbahar çeşitlerinin meyvelerinde geç kahverengi çürüklük (*Monilia fructigena*)*

Ekim ayının ilk on gününde yağış, üst toprak katmanlarının durumunda ve mevsimsel toprak işleminin yapılmasına ilişkin koşullarda iyileşme öngörülmektedir. Yaz sonundaki kuraklık, kışlık bitkilerle ekim yapılması planlanan alanların ekim öncesi toprak işleminin yapılmasını engellemiştir. Bu nedenle, Eylül ayında kışlık kolza ekimi için tarımsal-teknik son tarihler kaçırılmıştır.



Ekim, kışlık tahılların ekimi için en uygun zamandır. İlk on gün içinde Kuzey Bulgaristan'da buğday ekimi için tarımsal-teknik son tarih, 15-25 Ekim arası Güney Bulgaristan'da ve ayın sonunda Karadeniz kıyısı boyunca olan bölgelerdedir.

9-16 Ekim dönemindeki agrometeorolojik koşullar dinamik olacaktır. Bu yedi günlük dönemin başlangıcında, tahmin edilen ortalama günlük sıcaklıklar normalin üzerinde olacak ve geri kalanında iklim normları içinde kalacaktır. Dönemin başlangıcında Batı Bulgaristan'da, ortasına doğru ise Orta ve Doğu Bulgaristan'ın tarla alanlarında yerel ve hafif yağış öngörülmektedir. Yer yer miktarlar önemli olacak ve bu da üst toprak katmanlarının nemlenmesini iyileştirecektir. Don oluşumu için koşullar beklenmemektedir.

Batı Bulgaristan'daki bazı bölgeler hariç, tahmin döneminin ilk yarısında agrometeorolojik koşullar üzüm ve meyve plantasyonlarının son hasadı, sıra bitkileri ve geç sebzelerin alanlarının temizlenmesi ile teknolojik olgunluk aşamasında olan yem ve şeker pancarının kaldırılması için uygun olacaktır. Koşullar, kışlık tahılların ekimiyle ilgili tarımsal-teknik faaliyetlerin yürütülmesi için uygun olacaktır. Alanların yoğun yabancı ot istilası durumunda, sonbahar herbisit uygulamasının yapılması tavsiye edilir.



Dönemin ortasına kadar, agrometeorolojik koşullar mineral ve organik gübrelerin uygulanmasına ve ayrıca yeşillik için soğan, kışlık sarımsak, marul ve ıspanak ekiminin kış öncesi yapılmasına izin verecektir.

Tahmin döneminin ikinci yarısında beklenen yağmurlar, tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi olanaklarını büyük ölçüde sınırlayacaktır.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerde, agrometeorolojik koşullar olağan sıcaklıklara yakın sıcaklıklar tarafından belirlenecektir. İkinci on günlük dönemin ilk yarısında, üçüncünün başlangıcında ve ayın sonunda beklenen yağış, 50 cm katmanındaki toprak nem rezervlerini ve ekilen kışlık bitkilerin vejetasyonunun başlangıç aşamalarının seyri için koşulları iyileştirecektir. Ekim ayının sonunda, buğday ve arpada, ekim tarihlerine bağlı olarak, çıkış ve 1-2-3 yaprak oluşumu aşamaları gözlemlenecektir.



Ekim ayında, sonbahar mahsulleri zararlılar tarafından saldırıya uğrar. Kışlık tahıllarda, adi tarla faresi, buğday kara böceği ve buğday sineklerinin varlığı izlenmelidir. Zararlıların sayısı ekonomik zarar eşiğini (EZE) aştığında, zamanında ilaçlama

gereklidir. Adi tarla faresi için EZE, dekar başına 2 aktif koloni, adi buğday kara böceği için ise 3 larva/m²'dir.