


'Meyve ağaçlarının kış ilaçlaması'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.02.2016 Брой: 2/2016



Bu işlemi Şubat ayında kuru havalarda gerçekleştirin. Kış ilaçlaması, kış budaması ile aynı zamana denk gelmemelidir, çünkü ilaçlamada kullanılan bitki koruma ürünleri, budama yaraları ile temas ederse zarara neden olur. Sakin, rüzgarsız günler ilaçlama için uygundur, çünkü bu şekilde ilaçlı suyun rüzgarla taşınma riski yoktur.

Ne Zaman: Ağaçların dinlenme döneminde.

Amaç: Gövde ve dallarında kışlayan zararlıların ve hastalık etmenlerinin evrelerini yok etmek:

- şeftali yaprak kıvrıcıklığı, yaprak deliği hastalığı, erken kahverengi çürüklük, erik cep hastalığı, bakteriyel yanıklık;
- kırmızı örümcek akarının kış yumurtaları, yaprak bitleri, elma ve armut psillaları, kış kelekleri, San Jose kabuklubiti ve diğer kabuklubitler, erik koşnili, elma içkurdu, alıç akarı, yaygın örümcek akarı ve sarı elma

akarı;

Önemli Noktalar:

- Zararlılara karşı kış ilaçlaması, yalnızca ekonomik zarar eşiğinin üzerinde kanıtlanmış bir popülasyon yoğunluğu varsa gereklidir. Hastalıklar için ise zorunludur.
- Kış ilaçlamasından en iyi etki, tomurcuklar şişmeye başlamadan hemen önce yapıldığında elde edilir. O zaman, böceklerin ve akarların kışlayan evrelerinin gelişimi başlar. Yumurtadaki embriyo ileri bir gelişim aşamasındadır ve kışlayan tırtıllar ile ergin böcekler kış barınaklarını terk edip ağaç dalları boyunca hareket etmeye başlar.
- Doğru şekilde ilaçlama yapmazsanız, ürünleriniz ve emeğiniz boşa gider. Zararlıların en sık biriktiği tüm dal, ince dal ve dallanma noktalarını iyice ilaçlı suyla ıslatın, ayrıca gövdeyi de. Başka bir deyişle, tüm ağacı "yıkayın".

Ürünler:

- Hastalıklara karşı – %1 Bordo bulamacı, ve sadece şeftali yaprak kıvrıcıklığına karşı – buna ek olarak, Funguran OH 50 WP – %0.15, Champion – %0.3, Dithane DG – %0.3, Dithane M-45 – %0.3 veya Thiram 80 WG – %0.3 fungusitleri kullanılabilir.
- Zararlılara karşı – Parazomer %0.3.

Armut ağaçlarınız varsa

3–5 °C sıcaklıkta ve güneşli havalarda, armut psillası taç içinde hareket etmeye ve beslenmeye başlar, 8 °C'de ise yumurta bırakmaya başlar. İlaçlama zamanı budur. Alfamec 100 EC – %0.0125 veya Sumi Alpha 5 EC – %0.03'ten iyi bir etki elde edilecektir. Yumurta bırakma başladıktan sonra ise Deltamec 2.5 EC – %0.03 önerilir.