

Domateslerde yeni zararlılar - *C. includens*

Автор(и):

Дата: 13.03.2016 Брой: 3/2016



EPPO bölgesi ülkeleri için yüksek risk taşıyan zararlılar arasında Noctuidae familyasından aşağıdaki türler yer almaktadır:

***Chrysodeixis (Pseudoplusia) includens* (Lepidoptera: Noctuidae)**

Konukçu bitkiler: *C. includens* polifag bir zararlı olup 28 familyadan bitkiye saldırmakla birlikte, esas olarak soya ve domates zararlısı olarak kabul edilir. Diğer bitkiler arasında yonca, tütün, fasulye, soya, mısır, pamuk, lahana, marul ve ayrıca sardunya, hibiscus, ıtır, krizantem gibi süs türleri dikkate değerdir.

Zarar: Güveler yumurtalarını yapraklara bırakır, larvalar yapraklarda veya meyvelerde beslenir (domateste larva meyvenin içinde beslenir) ve yapraklar üzerinde pupa olur. Birçok bitkiye saldırmakla birlikte, ana konukçuları olan soya ve domateste aşağıdaki zararlar gözlemlenir:

- Domateslerde larvalar, yaprak bulunsa dahi, esas olarak meyvelerle beslenir.
- Soyada ise larvalar yaprakları tamamen tahrip ettikten sonra kapsüllere geçerek onlarla beslenir.

Yayılış: ABD'de erginler (güveler) daha sıcak olan güney eyaletlerinde (Florida ve Güney Teksas) kışı geçirir. İlkbaharda havaların ısınmasıyla diğer eyaletlere kuzeye doğru göç ederler. Güney eyaletlerin iklimi Akdeniz iklimine benzer. Avrupa'ya giriş yapması durumunda, güveler başarılı bir şekilde kışı geçirebilir ve ilkbaharda Bulgaristan gibi daha kuzeydeki diğer ülkelere göç edebilir.

Giriş yolları: Meyve ve sebzeler, dikim amaçlı bitkiler, kesme çiçekler, konukçu bitkilerin kapsülleri, zararlıının bulunduğu ülkelerden.

Olası risk: Zararlı Risk Analizi, *C. includens*'in bölge ülkelerinde yetiştirilen geniş bir konukçu yelpazesine saldırması nedeniyle riski yüksek olarak değerlendirmektedir. Zararlı giriş yaparsa, Akdeniz ülkelerinde kışı geçirebilecek ve kuzeye doğru göç edebilecektir.