

Domateslerde yeni zararlılar - sarı çizgili yaprak kurdu

Автор(и):

Дата: 13.03.2016 Брой: 3/2016



EPPO bölgesi ülkeleri için yüksek risk taşıyan zararlılar arasında Noctuidae familyasından aşağıdaki türler yer almaktadır:

***Spodoptera ornithogalli* (Lepidoptera: Noctuidae) ("Sarı çizgili tırtıl")**

Konukçu bitkiler: Polifag, domates, biber, patlıcan, patates, tütün, soğan, yer fıstığı, Brassicaceae familyası, Cucurbitaceae, pamuk, keten, pirinç, mısır, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, ayçiçeği, yonca, havuç, salatalık, şeker pancarı, kuşkonmaz gibi çok çeşitli bitkilere saldırır.

Zarar: Güve yumurtalarını yaprakların üzerine bırakır. Yumurtadan çıktıktan sonra larvalar yaprakların yanı sıra domates, biber ve pamuğun meyveleriyle de beslenir. Zararlı toprakta pupa

olur. *S. ornithogalli*, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde domates, biber, baklagiller, kabakgiller gibi sebze ürünlerinin yanı sıra tütün, soya fasulyesi, mısır ve yonca üzerinde önemli bir zararlı olarak belirtilmektedir.

Yayılım: Kısa mesafelerde erginlerin uçuşu yoluyla yayılır.

Giriş yolları: Yeni alanlarda zararlı, *S. ornithogalli*'nin bulunduğu ülkelerden kaynaklanan, konukçu bitkilerden elde edilen sebze meyveleri, dikim amaçlı bitkiler ve kesme çiçekler ile tanıtılır.

Olası risk: *S. ornithogalli* Avrupa için birincil öneme sahip birçok ürüne saldırır. Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO) çalışmalarına göre, zararlının bölgeye giriş riski yüksektir. Kuzeyde kışı geçiremez, ancak yetiştirme sezonu boyunca seralarda yayılması ve yerleşmesi muhtemeldir.