

Bağda ve meyve bahçesinde Nisan ayında

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2016 Брой: 4/2016



Bağlar

Nisan ayının ikinci yarısındaki meteorolojik koşullar genellikle asma hastalıklarının görülmesi için çok elverişlidir. Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme dönemleri, mildiyö ve külleme enfeksiyonları ile akar ve güve istilaları için en kritik zamanlardır.

Dönemin başlıca zararlıları

Külleme (oidium)

Asma mildiyösü

Sarı asma akarı

Eriophyid akarları

Avrupa asma güvesi

Asma kabuklu biti

Meyve Bahçeleri

Bu ay boyunca, meyve türlerinin meyveleri aktif olarak oluşur ve büyüklükleri artar. Yüksek sıcaklıklar ve sık sağanak yağışlar, hastalıklara karşı koruma sağlamak için yoğun bitki koruma gerektirir. Hastalık ve zararlıların ortaya çıkışını ve gelişimini izlemek için düzenli kontroller ve gözlemler yapılması gerekir. Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde mücadele, başlıca hastalık ve zararlılara – karaleke, külleme, ateş yanıklığı, yaprak bitleri, yaprak yiyen tırtıllar, meyve güveleri vb. – yöneliktir. Sert çekirdekli meyve türlerinde ise çiçek yanıklığı (erken kahverengi çürüklük), yaprak delen, külleme, beyaz pas, Gnomonia, meyve güveleri, yaprak bitleri vb. saldırılarına dikkat edilir. Meyve güvelerinin popülasyon yoğunluğu ve dinamikleri, bahçelere feromon tuzakları yerleştirilerek ve ayrıca kiraz sineği uçuşunun başlangıcını tespit etmek için "Rebell" tipi sarı yapışkan tuzaklar kullanılarak belirlenir.

Dönemin başlıca zararlıları

Elma karalekesi

Elma küllemesi

San Jose kabuklu biti

Amerikan beyaz kelebeği

Elmada, ekonomik açıdan en önemli hastalıklar olan karaleke ve küllemeye karşı ilaçlamalar kombine şekilde yapılabilir.

Mücadele için kayıtlı fungisitler, "Bitki Koruma" dergisi tarafından yayınlanan Kullanım İzni Bulunan Bitki Koruma Ürünleri Sicili'nde (2016) listelenmiştir.