

Sebze Bahçesinde Nisan Ayında

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2016 Брой: 4/2016



Dönem boyunca uygulamalar: Erken ve orta-erken açık alan üretimi için fide bakımı devam ediyor. Erken domates, biber ve patlıcanların nisan sonunda, orta-erken olanların ise mayıs ayının ilk on gününde şaşırtılması için parseller hazırlanıyor. Geç domates ve orta-erken baş lahana tohumları ekiliyor. Korunan yetiştirme tesislerindeki ürün gelişimi için optimal koşulları sağlamak amacıyla gerekli agroteknik uygulamalar yapılıyor. Yüksek sıcaklıklarda, bağıl hava nemini iyileştirmek için yollar sık sık nemlendiriliyor ve cam seralarda kısa süreli sisleme de yapılıyor. Güneş radyasyonu daha yoğunsa, cam uygun karışımlarla gölgelendiriliyor (beyazlatılıyor).

Bitki koruma:

1. Eğer dezenfekte edilmemişlerse, domates ve lahana tohumlarının ekim öncesi işlemi. Tohum çimlenmesini yok etmemek için teknolojik gerekliliklere uyulmalıdır.

2. Fide yastıklarındaki toprak karışımları zorunlu olarak dezenfekte edilmelidir. Danaburnuna karşı yemler serpilir.
3. Fidelerde kök çürüklüğü (çökerten) ile mücadele için, hastalıklı bitkiler ve onlara bitişik sağlıklı bitkiler seranın dışında uzaklaştırılır ve imha edilir, altlarındaki toprak fungusit çözeltisi ile sulanır.
4. Son toprak işlemesi ile birlikte, ön incelemede 5 adet/m²'den fazla telkurdu tespit edildiğinde granül böcek ilaçları uygulanır. Bu uygulama aynı zamanda tırtıllara, danaburnuna, telkurdu larvalarına, Colorado patates böceğine, nematodlara karşı etkilidir ve emici zararlılara – yaprakbitleri, yaprakpireleri, thripslere karşı kalıntı etkisi gösterir.
5. Şaşırtmadan bir hafta önce, fideler fungusitlerle püskürtülür. **Domateslerde erken yanıklık (Alternaria), gri küf (Botrytis), külleme, yaprak küfü** gözlemlenirken, **hıyarda – külleme, mildiyö, köşeli yaprak lekesi (bakteriyoz)** görülür.
6. Korunan yetiştirme tesislerindeki zararlı kompleksi aynı olmasına rağmen, daha yüksek sıcaklık ve düşük bağıl hava nemi nedeniyle **thrips** ve **örümcek akarlarının** zararlı aktivitesi artar.
7. Açık alandaki erken ürünlerde **mildiyö** görülme riski vardır – lahanagillerde, soğanda ve erken patatest. Bölgesel servislerden gelen sinyaller izlenmeli ve zamanında kontrol önlemleri uygulanmalıdır.
8. Soğan ürünleri için **soğan sineği ve yaprak galeri sineği**, lahana ve turp için ise **lahana sineği** riski bulunmaktadır.

Dikkat: Lahanagil ve soğan ürünleri püskürtülürken, pestisit çözeltisine zorunlu olarak bir adjuvan eklenmelidir. İlkbahar başında taze tüketim için sunulan yeşil soğan ve sarımsak, turp vb. ürünler işlenirken, istenmeyen ve tehlikeli pestisit kalıntısı zehirlenmelerinden kaçınmak için dikkatli olunması gerekir.