

Syngenta, Petrich'te yeni sera salatalık hibridi Tribuno F1'i tanıttı

Автор(и): syngenta, България
Дата: 17.05.2016 Брой: 5/2016



Syngenta, bir başka üst üste yıl için, uzun meyveli sera salatalığı üreticilerine yönelik bir açık kapı günü düzenledi. Bu yılki buluşma, bölgenin en büyük sera kompleksinin sahibi olan "V and VGD Greenhouses Petrich" Ltd. şirketinin nazik yardımıyla organize edildi.

Etkinliğin amacı, Syngenta'nın portföyündeki iki yeni ürünün, yani yeni sera salatalığı hibridi Tribuno ve salatalıklar için en son geniş spektrumlu fungusit olan Cidely Top'ın tanıtımıydı.



Toplantıya, hibridin artık kimse için sır olmayan yüksek verim potansiyelini bizzat görüp ikna olan bölgedeki başlıca üreticilerden bazıları katıldı. Tribuno, iyi hastalık direnci, fide dikim dönemi konusunda esneklik ve yüksek verim potansiyelini bir araya getiriyor. Tribuno'nun plastisitesi, onun cam ve polietilen seralarda hem ilkbaharda hem de yazın eşit derecede iyi yetiştirilmesine olanak tanır. Hibridin ayırt edici bir özelliği, dengeli vejetatif-generatif büyümesidir. Bitki orta büyüklükte yapraklara sahiptir ve yetiştirme sezonu boyunca çiçek dökülmesine karşı toleranslıdır. Tribuno'nun meyveleri tam olarak Bulgar pazarının gereksinimlerini karşılar. Meyveler koyu yeşil, parlak ve hafifçe dilimlidir. Uzunlukları yaklaşık 30-34 cm'dir ve boyun oluşturmazlar. Hibridin karakteristik bir özelliği, meyve vermenin ana gövdeden yan dallara hızlı geçişi ve hem ilkbahar hem de yaz dikimlerinde yüksek nihai verimdir.

Bitki korumada odak, Syngenta'nın kabakgiller için en yeni fungusiti üzerindeydi. Bu, şu anda Bulgaristan'da salatalıklarda 5 ana hastalığı kontrol eden tek geniş spektrumlu fungusittir. Cidely Top, **külleme** *Podosphaera xanthii*, *Erysiphe cichoracearum*, **alternarya** *Alternaria cucumerina*, **siyah kök çürüklüğü** *Didymella bryoniae*, **uyuz** *Cladosporium cucumerinum*, **kabakgillerde antraknoz** *Colletotrichum lagenarium*'a karşı mükemmel bir etkiye sahiptir.



Cidely Top'ın başlıca avantajlarından biri, gaz fazı yoluyla etki etmesidir; bu, külleme ile mücadelede, özellikle yoğun gelişmiş vejetatif kütleyle sahip ürünlerde çok önemlidir. Bu tür ürünlerde fungusitlerin bitkilerin iç kısımlarına nüfuz etmesi zordur, ancak bu Cidely Top için geçerli değildir, çünkü gaz fazı sayesinde fungusitlerin derinlemesine nüfuz etmeyi başarır. Cidely Top, farklı etki modlarına sahip iki aktif maddeye dayalı olarak formüle edilmiş yenilikçi bir üründür - bu, fungusitin patojenlere karşı saldırganlığını artırır. İki aktif madde farklı kimyasal gruplardandır, bu da direnç gelişimini önler. Cidely Top, triazollere dirençli olanlar da dahil olmak üzere küllemenin tüm suşlarına karşı aktiftir. Cidely Top'un kullanımı, hastalık belirtilerinin ilk görüldüğü anda önerilir. Tavsiyeler, 10 günlük aralıklarla iki uygulamadır. Cidely Top'un uygulama dozu 100 ml/dekar'dır ve hasat öncesi bekleme süresi 3 gündür.