

Aylık Tarımsal Meteorolojik Tahmin - Mayıs 2016

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.05.2016 Брой: 5/2016



Mayıs ayında tarım ürünleri için kritik minimum sıcaklıklar öngörülmemekle birlikte, mevsim normallerinin altında seyredeceklerdir. Dolu riski yüksektir. Dolu zararı durumunda, yaraların iyileşmesini hızlandırmak ve patojenlerin neden olduğu ikincil enfeksiyon riskini azaltmak için, etkilenen meyve bahçelerinin ilk fırsatta bakır içerikli fungusitlerle muamele edilmesi tavsiye edilir.

Mayıs ayının ilk on günlük döneminde, agrometeorolojik koşullar dengesiz ve serin hava tarafından belirlenecektir. Beklenen önemli yağışlar, tarla alanlarının birçok yerinde üst toprak katmanlarının suya doymuş halde kalmasına neden olacak ve bu da ekim öncesi toprak işlemeyi güçleştirecek, tane mısıırı ve bazı termofilik ilkbahar ürünlerinin – fasulye, pamuk, yer fıstığı, karpuz, kavun vb. – ekimini geciktirecektir. On günlük dönem boyunca, asmada mildiyö (*Plasmopara viticola*), sert çekirdekli meyve türlerinde çiçek yanıklığı (*Monilia laxa*) ve yaprak deliği hastalığı (*Stigmia carpophila*), elmada (*Venturia inaequalis*) ve armutta (*Venturia pirina*)

karaleke, ayvada meyve dökümü (*Monilinia cydoniae*), çilekte gri küf (*Botrytis cinerea*) gibi belirli fungal hastalıkların gelişimi için koşullar elverişli olacaktır.

Bu dönemde, kışlık ürünlerin ve ekilen ilkbahar ürünlerinin vejetasyonu, normalin altındaki termal koşullarda daha yavaş bir hızda ilerleyecektir. Yüksek tarlalardaki buğday ve arpada, sap uzamasından başaklanmaya geçiş gerçekleşecektir. Tarla alanlarında, ürünlerin hakim gelişim aşaması başaklanma olacaktır. Tuna Ovası'nın bazı yerlerinde ve Güney Bulgaristan'da, kışlık tahıllarda çiçeklenmenin başlangıcı da gözlemlenecektir.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerin çoğu gününde, tarım ürünlerinin gelişimi iklim normallerine yakın sıcaklıklarda gerçekleşecektir. Mayıs ayının ikinci yarısında beklenen yağışlar, 50 ve 100 cm katmanlardaki toprak nem rezervlerinin iyi bir seviyede (tarla kapasitesinin %85'inin üzerinde) kalmasını sağlayacak ve tane oluşumu ve dolumunun devam ettiği kışlık tahıllar üzerinde faydalı bir etkiye sahip olacaktır. İkinci on günlük dönemin sonunda, bazı güney bölgelerde arpa, alışlagelenden daha erken süt olum aşamasına girecektir. Mayıs sonunda, süt olum aşaması Tuna Ovası'nın bazı bölgelerinde ve Güney Bulgaristan'ın bazı yerlerinde buğdayda da gözlemlenecektir. Ay boyunca, mısır ve ayçiçeğinde yaprak oluşumu ilerleyecektir. Üçüncü on günlük dönemin sonunda, agroteknik zaman dilimi içinde ekilen ayçiçeği ekilişlerinde çiçeklenme tomurcuğu oluşumu gözlemlenecektir.

Mayıs ayında tarım ürünleri için kritik minimum sıcaklıklar öngörülmemekle birlikte, dolu riski devam etmektedir. Dolu zararı durumunda, yaraların iyileşmesini hızlandırmak ve patojenlerin neden olduğu ikincil enfeksiyon riskini azaltmak için, etkilenen meyve bahçelerinin ilk fırsatta bakır içerikli fungisitlerle muamele edilmesi tavsiye edilir.

Kaynak: NIMH-BAS