

Sebze bahçesinde Mayıs ve Haziran aylarında

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.05.2016 Брой: 5/2016



Dönem boyunca uygulamalar: Geç domates, orta erkenci baş ve karnabahar, pırasa fidelerinin bakımı yapılır – sulama, gübreleme, yabancı ot mücadelesi. Daha önce dikimi yapılmış erken tarla sebzeleri ve doğrudan ekimi yapıp çıkış gerçekleşmiş sebze türleri için gerekli agroteknik uygulamalar yapılır. Dönem, sık sağanak yağışlar ve buna bağlı olarak daha yüksek hava ve toprak nemi ile karakterizedir. **Patateste mildiyö** ve **lahana ile soğanda mildiyö türlerinin** ortaya çıkması ve gelişmesi için sözde kritik dönemler oluşur; bu dönemler bir dizi agrometeorolojik koşul tarafından belirlenir: tam bulut örtüsü, 2-3 gün sakın ve uzun süreli yağış, düşük sıcaklık, %80'in üzerinde nispi hava nemi. Yağış kısa süreli olursa, **erken yanıklık (siyah yaprak lekesi)**nin gelişimini destekler ve kuvvetli rüzgarla birlikte olursa **bakteriyel hastalıkların** (yaprak lekeleri ve yanıklıklar) gelişimini destekler.

Bitki koruma:

Domates ve hıyarda hastalıklar

Domates: fidelerde, **erken yanıklık (siyah yaprak lekesi)** (*Alternaria*) ve **mildiyö** gözlemlenir. Örtüaltı yetiştiriciliğinde bunlara ek olarak, **külleme, küf (*Botrytis*)** ortaya çıkar ve tarla domateslerinde ise ayrıca **bakteriyel yaprak lekeleri** ve **yanıklıklar** görülür, ancak **külleme** görülmez. Tarla üretiminde mücadele, bölgesel servislerden bildirim alındığında yapılmalıdır.

Hıyar: örtüaltı yetiştiriciliğinde **külleme ve mildiyö, köşeli yaprak lekesi** (bakteriyel hastalık) ile karşılaşılır.

Domates ve hıyarda zararlılar örtüaltı yetiştiriciliğinde sabit bir kompozisyona sahiptir, ancak örümcek akarları ve thripsler için şiddetli zararlı aktivite için koşullar daha elverişlidir – yüksek sıcaklıklar ve düşük nispi nem. Bu nedenle, sık sık sisleme yapılması ve yolların nemli tutulması gereklidir. Cam uygun karışımlarla gölgelenmelidir. Ürünlerin yoğun meyve verme döneminde olduğu düşünülerek, hasat öncesi bekleme süresi kısa olan pestisitler kullanılmalıdır.

Açıkta domates, biber, patlıcan da bu dönemde şunlar zararlıdır: **yaprak bitleri, thripsler** (domates lekeli solgunluk virüsü vektörleri), **tırtıllar, patates böceği** ve genellikle haziran başından itibaren **stolbur** fitoplazmasını taşıyan ***Hyalesthes obsoletus* uçkununun** uçuşu başlar. Mücadele, bölgesel bitki koruma servislerinin belirttiği en uygun zamanda ilaçlamalar yapıldığında başarılı olur.

Lahana mildiyö tarafından saldırıya uğrar, buna karşı patatesten mildiyö için önerilen ürünler uygulanır. Zararlılar arasında şunlar zararlıdır: **yaprak bitleri, pire böcekleri, kokulu böcekler, tütün thrips, lahana kök sineği, lahana güvesi, lahana kelebeği, yaprak kurdu tırtılları**.

Soğan – dikkat **mildiyö, tütün thrips, pırasa galeri sineği** üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Bunlara karşı diğer ürünler için yukarıda belirtilen ürünler uygulanır.

Lahana ve soğan ürünlerine uygulanan pestisit çözeltilerine ıslatıcı ve yapıştırıcı bir ajan eklemeyi unutmayın.