

Kök çürüklüğü mantarı (*Heterobasidium annosum*)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.06.2016 Брой: 6/2016



Orman Koruma İstasyonları – Sofya, Filibe, Varna tarafından yürütülen orman patolojik araştırmaları, belirtilen bölgelerdeki rüzgar devriğinden etkilenmiş meşcerelerde ve ayrıca Vitoşa'daki ladin meşcereleri ve plantasyonlarının çoğunda, kök çürüklüğü mantarı (*Heterobasidium annosum*) enfestasyonlarının da gözlemlendiğini göstermektedir. Bu mantar, onlarca yıl boyunca ladin, göknar ve Makedon çamının öz odununda gelişir, herhangi bir görünür dış semptom olmaksızın 7–8 m, bazı durumlarda daha da fazla bir yüksekliğe ulaşır. Güçlü, aşırı rüzgarlar veya ağır ıslak kar sırasında, gövdeler mantarın neden olduğu odun çürümesinin gelişimine karşılık gelen yükseklikte kırılır.

Son yıllarda, toplam enfeste alan en hızlı şekilde Bölgesel Orman Müdürlükleri Köstendil, Blagoevgrad ve Sofya bölgelerinde artmaktadır. Bu meşcerelerde ve plantasyonlarda sıhhi kesim

planlanmaktadır. Batı Rodoplar'da eski tarım arazileri üzerinde kurulmuş 30–40 yaşındaki iğne yapraklı meşcerelerde ve ayrıca Vitoşa, Pirin ve Rila'nın olgun ladin ormanlarında bu mantarın enfestasyon alanında ve yoğunluğunda bir artış beklenebilir.