

Hastalıklar geri çekiliyor, zararlılar ilerliyor

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.06.2016 Брой: 6/2016



Sebze ve meyve mahsullerini korumak için, Haziran ayının ikinci yarısı ve Temmuz ayı boyunca zararlılarla mücadeleyle devam etmek gerekmektedir.

Bu dönemde hava ve toprak sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle, ilaçlama sabah erken saatlerde veya akşamüzeri yapılmalıdır. Yağışlar azdır ve hava nemi açığı artar. Meyveler yoğun bir şekilde büyür ve sürgün gelişimi tamamlanır. Yüksek hava sıcaklıkları sonucunda, meyvelerde "güneş yanığı" adı verilen hasarlar gözlemlenir.

Zararlıların popülasyon yoğunluğunu ve hastalık enfeksiyon seviyesini azaltmak için dökülen meyvelerin toplanması ve bahçelerden uzaklaştırılması çok önemlidir.

Kuraklık, mahsullerdeki bakteriyel ve fungal hastalıkların gelişimi için çok elverişli değildir ve yayılımları daha sınırlıdır, ancak zararlıların – meyve güveleri, akarlar, yaprak galeri güveleri, bağ

güvesi, ağ örümcekleri, yaprakbitleri – çoğalması için "hoş" bir ortamdır.

Sebzeler

Dönemin Başlıca Zararlıları

- Domateslerde mildiyö
- Domateslerde erken yanıklık /Alternaria/
- Domateslerde külleme
- Domateslerde beyaz yaprak lekeleri
- Domateslerde bakteriyel benek
- Kabakgillerde mildiyö
- Kabakgillerde külleme
- Sebze mahsullerinde yaprakbitleri
- Sümüklü böcekler

Patates

Dönemin Başlıca Zararlıları

- Patateste mildiyö
- Patateste erken yanıklık /Alternaria/
- Patates böceği
- Yaprakbitleri

Meyve Mahsulleri

Dönemin Başlıca Zararlıları

- Elma içkurdu
- Erik içkurdu
- Şeftali güvesi
- San Jose kabuklubiti
- Ağ örümceği
- Avrupa kırmızı örümceği
- Yuvarlak yaprak galeri güvesi
- Armut psillidi
- Meyve türlerinde yaprakbitleri
- Elma ve armut kabuğu
- Elma küllemesi
- Şeftali küllemesi

Bağ

Dönemin Başlıca Zararlıları

- Külleme /Oidium/
- Mildiyö
- Kurşuni küf
- Sarı baş akarı
- Baş güvesi