

Ağustos 2016 için Agrometeorolojik Tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2016 Брой: 8/2016



İlk on günlük dönemin ortasında sıcaklıklarda düşüş ve termal koşulların normalleşmesi bekleniyor. On günlük dönemde Batı Bulgaristan'da yağış tahmin ediliyor ve tarım ürünlerinin gelişimi için koşullarda iyileşme öngörülüyor.

Ağustos ayında, tarım ürünlerinin gelişimi, iklim normlarının civarında ve üzerindeki sıcaklıklarda ve ülkenin büyük bir kısmında – toprak nem açığı koşullarında ilerleyecek. Temmuz sonunda, bazı batı bölgeler hariç, ilkbahar ürünlerinde 50 ve 100 cm katmandaki toprak nem rezervleri düşüktü – tarla kapasitesinin %50–60'ının altında.

Ağustos başında tahmin edilen kuru ve sıcak hava, yer yer 38–39°C'ye varan aşırı yüksek maksimum sıcaklıklarla, ilkbahar ürünlerinde fizyolojik süreçlerin normal seyrini bozacak ve geç mısır hibritleri ile sebze ürünlerinde çiçeklenme ve döllenme üzerinde olumsuz etki yapacaktır.

İlk on günlük dönemin ortasında sıcaklıklarda düşüş ve termal koşulların normalleşmesi bekleniyor. On günlük dönemde Batı Bulgaristan'da yağış tahmin ediliyor ve tarım ürünlerinin gelişimi için koşullarda iyileşme öngörülüyor. Doğu ve güney bölgelerde toprak nem açığı derinleşecek, bu da geç ilkbahar ürünlerinde artırılmış sulama normlarının uygulanmasını gerektirecektir.

Ağustos ayının ilk on günlük döneminde, erkenci mısır hibritlerinde süt olumu aşaması ve süttен balmumu olumuna geçiş gerçekleşecek. Ayçiçeğinde, Tuna Ovası'nın bazı yerlerinde ve ülkenin güney bölgelerinde, olgunlaşma aşamasının başlangıcı gözlemlenecek.

Ağustos'un ikinci yarısında, geç tarla ürünlerinin bir kısmı gelişimini tamamlayacak. Ayçiçeğinde kitlesel teknik olum, soya fasulyesinde ise olgunlaşma aşaması gözlemlenecek. Ay sonunda, orta-geç mısır hibritlerinde balmumu olumu hakim olacak. Pamukta, koza açılmasının başlangıcı gözlemlenecek.

Ağustos'un üçüncü on günlük döneminde, agrometeorolojik koşullarda bir değişiklik bekleniyor. Yağış olasılığında artış tahmin ediliyor, ayrıca üst toprak katmanlarındaki su durumunda iyileşme öngörülüyor; bu da, kışlık kanola ekimi için ayrılan alanların daha kaliteli derin sürümü ve ekim öncesi toprak işleme için büyük önem taşıyor. Ağustos sonunda, kanola ekimi için agroteknik dönem başlıyor.

Kaynak: NIMH-BAS