

Eylül ayı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.09.2016 Брой: 9/2016



*İlk on günlük dönemde önemli yağış beklenmemektedir. Dönemin çoğu gününde, mevsimlik tarla işlerinin yürütülmesine imkan sağlayacak koşullar olacak - ayçiçeği ve erkenci mısır hibritlerinin hasadı, kışlık kanola ekimi için ayrılan alanlarda derin sürüm ve ekim öncesi toprak işleme yapılacaktır. **Kanola ekimi için optimal agroteknik dönem Eylül ayının ilk yarısıdır.***

Ay boyunca, kırmızı şaraplık üzüm çeşitlerinin büyük bir kısmı, olağan tarihlerden daha erken olarak teknolojik olgunluğa ulaşacak. Yüksek şeker içeriğine sahip bir üzüm hasadı beklenmektedir.

Eylül ayında, uzun süren yaz kuraklığının olumsuz etkilerini atlatmış olan geç tarım ürünlerinin gelişimi, iklim normlarının civarında ve üzerindeki sıcaklıklarda ilerleyecek. Ağustos sonundaki yağışlar, bazı yerlerde 25-30 l/m²'nin üzerinde (Vidin, Lom, Loveç, Veliko Tırново, Şumen, Silistra, Filibe, Sliven) gerçekleşmiş olup, toprak nemi eksikliği nedeniyle vejetasyonunu erken tamamlayan bir kısım yazlık ürünler için geç kalmıştır. Bu yağışlar, ikinci ürünler ve geççi mısır hibritlerinin gelişimi için koşulları iyileştirmiştir.

Eylül başında, geççi mısır hibritleri süt olumu aşamasında olacak, orta-geççi olanlar ise yaygın balmumu ve tam

olum gösterecektir.

İlk on günlük dönemde önemli yağış beklenmemektedir. Dönemin çoğu gününde, mevsimlik tarla işlerinin yürütülmesine imkan sağlayacak koşullar olacak - ayçiçeği ve erkenci mısır hibritlerinin hasadı, kışlık kanola ekimi için ayrılan alanlarda derin sürüm ve ekim öncesi toprak işleme yapılacaktır. Kanola ekimi için optimal agroteknik dönem Eylül ayının ilk yarısıdır.

İkinci on günlük dönemin başında, önemli bir sıcaklık düşüşü, yağış ve olgunlaşan meyve ile üzüm hasadında çürüklüğe neden olan patojenlerin gelişimi için artan risk öngörülmektedir - üzümde gri küf (*Botrytis cinerea*), sonbahar-kış meyve çeşitlerinin meyvesinde kahverengi çürüklük (*Monilia fructigena*).

Eylül ayının ikinci yarısında, geç tarım ürünlerinin nihai gelişim aşamaları, yaz sonu ve sonbahar başı için olağan termal koşullar altında ilerleyecek. İkinci on günlük dönemin sonuna kadar, geçici mısır hibritlerinin büyük bir kısmı balmumu ve tam olum gösterecektir. Üçüncü on günlük dönemde, pamuk yaygın bir olgunlaşma aşamasında olacaktır.

Üçüncü on günlük dönemin başında, öngörülen yağışlar üst toprak katmanlarındaki nem rezervlerini iyileştirecek olup, bu durum kışlık kanolanın ilk vejetasyon aşamalarının normal seyri için önemli öneme sahiptir. Eylül sonuna kadar, agroteknik dönem içinde ekilen kanola ekimleri çıkış aşamasında olacaktır.

Ay boyunca, kırmızı şaraplık üzüm çeşitlerinin büyük bir kısmı, olağan tarihlerden daha erken olarak teknolojik olgunluğa ulaşacak. Yüksek şeker içeriğine sahip bir üzüm hasadı beklenmektedir.

Kaynak: NIMH-BAS