

Ekim ayı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.10.2016 Брой: 10/2016



Ekim ayında tarımsal meteorolojik koşullar, iklim normallarına yakın sıcaklıklar ve yağışlarla belirlenecektir. İkinci ve üçüncü on günlük dönemin başında tarımsal meteorolojik koşullar artan bir dinamizmle karakterize edilecektir. Tahmin edilen yağışlar, ekilen kanola ve kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonunun ilk aşamalarının normal ilerleyişi için gerekli nemi sağlayacaktır.

Ekim ayının ilk günlerinde, tahmin edilen güneşli ve mevsime uygun sıcak hava, geç tarım ürünlerinin son gelişim aşamalarının tamamlanmasını hızlandıracak ve sonbahar çeşidi meyve ağaçları ile geç şaraplık üzüm çeşitlerinin meyvelerinde daha fazla şeker sentezi için ön koşul oluşturacaktır.

İlk on günlük dönemin ortasında önemli bir sıcaklık düşüşü ve tarımsal meteorolojik koşullarda kayda değer bir değişiklik beklenmektedir. Uzun süren yaz kuraklığının ardından Ekim ayının ilk haftasında tahmin edilen yağışlar, üst toprak katmanlarındaki su-fiziksel durumu iyileştirecektir.

Sonbahar başındaki yağışlar ülke toprakları üzerinde eşit olmayan şekilde dağılmıştır. Kuzey Bulgaristan'ın bazı yerlerinde 40–50 l/m²'yi aşmıştır (Vidin – 44 l/m², Vratsa – 46 l/m², Loveç – 70 l/m², Plevne – 44 l/m², Sviştov – 45 l/m², Razgrad – 52 l/m², Dobriç – 42 l/m²). Güney Bulgaristan'ın çoğunda yağış önemsiz düzeyde kalmıştır – 10 l/m²'nin altında. Güney bölgelerde kuru ve sıkışmış toprak, mevsimlik toprak işleme operasyonlarının uygulanmasını zorlaştırmıştır.

Ekim ayının ilk on günlük döneminde, ekim öncesi toprak işleme ve kışlık tahıl ürünlerinin ekimi için koşullarda bir iyileşme beklenmektedir. Bu dönem, Kuzey Bulgaristan'da buğday ekimi için tarımsal teknik penceredir; 15-25 Ekim tarihleri arasında – Güney Bulgaristan için; ve üçüncü on günlük dönemde – Karadeniz kıyısındaki bölgeler için. İkinci ve üçüncü on günlük dönemin başında tarımsal meteorolojik koşullar artan bir dinamizmle karakterize edilecektir. Tahmin edilen yağışlar, ekilen kanola ve kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonunun ilk aşamalarının normal ilerleyişi için gerekli nemi sağlayacaktır.

Ayın son haftasında, sonbahar ürünlerinin gelişimi daha yavaş bir hızda ilerleyecektir. Ekim sonunda, ayın ikinci yarısında ekilen buğday ve arpada baskın büyüme aşaması çimlenme olacaktır. Ekim ayının ilk on günlük döneminde ekilen ürünlerde, üçüncü yaprak aşaması kitlesel ölçekte gözlemlenecektir. En erken ekilen kışlık tahıl ürünleri, Eylül ayının üçüncü on günlük döneminde ekilenler, Ekim sonuna kadar kardeşlenme başlangıcına ulaşacaktır. Eylül ayında ekilen kışlık kanola ürünlerinde (Çırpan, Yambol, Sliven, Eski Zağra bölgelerinde), rozet oluşumu aşaması gözlemlenecektir.

Kaynak: NIMH-BAS