

'Agrometeorolojik koşullar elma ve armut yetiştiriciliğinde derin sürüm ve budama için uygundur'

Автор(и): Растителна защита

Дата: 25.12.2016 Брой: 12/2016



Kış başlangıcında, sonbaharda ekilen ürünlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler çeşitlilik gösteriyor. Kuzey Bulgaristan'daki kışlık tahıl ürünleri ve kışlık kolzanın durumu daha iyi. En güney bölgelerde, toprak nemi eksikliği sonucunda, çıkış aşamasında bazı buğday ekim alanları kurudu. Takip eden dönemde, tarla bölgelerinin çoğunda koşullar, derin sürüm ve soğuğa dayanıklı yumuşak çekirdekli meyve türlerinin (elma, armut) budanmasına izin verecek.

Önümüzdeki yedi günlük dönemin çoğu gününde, tarımsal meteorolojik koşullar, Aralık ayının üçüncü on günlük dönemi için iklim normlarının üzerinde sıcaklıklar ve nispeten kuru hava tarafından belirlenecek. Tarla bölgelerinde, ortalama günlük sıcaklıklar, sonbaharda ekilen ürünleri

dinlenme halinde tutacak aralıklarda olacak. Buğday ve arpada üçüncü yaprak ve kardeşlenme aşamaları, kışlık kolzada ise rozet aşaması baskın olacak.

Kış başlangıcında, sonbaharda ekilen ürünlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler – iyiden tatmin edici olmayan ve zayıfa kadar – çeşitlilik gösteriyor. Kuzey Bulgaristan'daki kışlık tahıl ürünleri ve kışlık kolzanın durumu daha iyi. Güney Bulgaristan'ın bazı yerlerinde, uzun süren sonbahar kuraklığı, ekim alanlarının düzensiz bitki sıklığı ve gecikmiş vejetasyonunun nedeni. Kışlık tahıl ekim alanlarının bir kısmının boyu 5–6 cm, kolzanınki ise 10–12 cm.

En güney bölgelerde, toprak nemi eksikliği sonucunda, çıkış aşamasında bazı buğday ekim alanları kurudu.

Takip eden dönemde, tarla bölgelerinin çoğunda koşullar, derin sürüm ve soğuğa dayanıklı yumuşak çekirdekli meyve türlerinin (elma, armut) budanmasına izin verecek.

Kaynak: NIMH-BAS