

Şubat ayı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.02.2017 Брой: 2/2017



Şubat ayında tarımsal meteorolojik koşullar, sıcaklıkların iklim normalleri civarında ve altında seyretmesiyle belirlenecektir. Ay boyunca, eksi 14–19°C aralığında tahmin edilen minimum sıcaklıklar, kışlık tarım ürünlerinin bir bölümünün kışa dayanıklılığını bir kez daha test edecektir. Bağlarda ve meyve bahçelerinde budama için uygun koşullar, ayın ilk yarısında oluşacaktır.

Ocak ayındaki düşük negatif sıcaklıklar, Güneybatı Bulgaristan'ın birçok yerinde meyve ağaçları ve asmalarda değişen derecelerde don hasarına neden oldu.

Soğuk Ocak havasının ardından, Şubat ayının ilk on günlük dönemi için sıcaklıklarda bir artış öngörülmektedir, ancak ortalama günlük değerleri, sonbaharda ekilen ürünleri derin dormansi (uyku) halinde tutacak sınırlar içinde kalacaktır.

İkinci on günlük dönemde, sıcaklık koşullarında daha belirgin bir iyileşme beklenmekte olup, ülkenin güney bölgelerindeki kışlık tahıl ürünlerinin bir kısmı derin dormansiden göreceli dormansiye geçiş yapacaktır.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerin daha sıcak periyotlarında, maksimum sıcaklıkların 14–15°C üzerinde tahmin edildiği zamanlarda, ortalama günlük değerler – güney ve güneydoğu bölgelerindeki bazı yerlerde – kışlık tahıl ürünlerinde vejetatif süreçlerin yeniden başlaması için gerekli olan biyolojik minimuma yaklaşacaktır. Bazı lokasyonlarda, buğday ve arpada, zayıf bir şekilde ifade edilen vejetasyon için koşullar oluşabilir, ancak bu, ürünlerin fenolojik durumunda bir değişikliğe yol açmayacaktır. Şubat ayı sonunda, kışlık tahıl ürünleri üçüncü yaprak ve kardeşlenme büyüme aşamalarında olacaktır.

Şubat ayının üçüncü on günlük dönemindeki tahmin edilen sıcaklıklar, meyve ürünlerinin bir bölümünde zorunlu dormansiyi bozacaktır. Ülkenin saha bölgelerindeki erken çiçek açan sert çekirdekli meyve türlerinde (badem, kayısı, şeftali, kiraz) tomurcuk şişmesi meydana gelecektir.

Şubat ayındaki yağışlar, aylık norm civarında ve altında gerçekleşerek toprak nem rezervlerini iki metrelik katmanda da artıracaktır. Ocak ayındaki norm üstü yağışların (Vratsa 76 l/m², Veliko Tarnovo 78 l/m², Varna 66 l/m², Dobriç 57 l/m², Filibe 66 l/m², Kırcaali 62 l/m², Hasköy 120 l/m², Çırpan 74 l/m², Eski Zağra 79 l/m², Burgas 58 l/m²) bir sonucu olarak, kar erimesinden sonra, ülkenin büyük bölümünde bir metrelik katmandaki toprak nem rezervlerinin tarla kapasitesine (FC) yakın seviyelere ulaşması beklenmektedir.

Şubat ayında, bağlarda ve meyve bahçelerinde budama yapmak için daha uygun koşullar, ayın ilk yarısında oluşacaktır. Eksi 17–18°C'nin altında minimum sıcaklıkların kaydedildiği bölgelerde (Vidin, Kneja, Şumnu, Pazarcık, Filibe, Eski Zağra, Çırpan), asma budaması daha sonra, olası don hasarı belirlendikten sonra yapılmalıdır.

Ayın ikinci yarısında, tahmin edilen sık sağanak yağışlar, ülkenin birçok bölgesinde üst toprak katmanlarının suya doymuş halde kalmasına neden olacak ve bu da sonbaharda ekilen ürünlerin azotlu mineral gübrelerle üstten gübrenmesini engelleyecektir.

Kaynak: NIMH-BAS