

Domates ve salatalıklarda thrips

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.02.2017 Брой: 2/2017



Saldırıya uğrayan bitki organlarında (yapraklar, yaprak sapları, çiçekler ve meyveler) zararının dışkıları olan koyu noktalı küçük beyazımsı lekeler oluşur. Yüksek popülasyon yoğunluğunda lekeler birleşir. Seralarda aşağıdakiler zararlıdır:

Tütün thrips *Thrips tabac* – çoğunlukla yapraklarda bulunur, çiçeklere daha seyrek saldırır. Gelişimi için uygun koşullar yüksek sıcaklık ve düşük hava nemidir.

Batı çiçek (Kaliforniya) thrips *Franklinella occidentalis* – salatalıklarda zararının çiçekleri tercih ettiği tespit edilmiştir. Gelişimlerinin erken aşamalarında saldırıya uğrayan bitkilerin generatif organları (tomurcuklar ve yumurtalıklar) kurur ve dökülür.

Sera thrips *Heliothrips haemorrhoidalis* – larvalar ve erginler bitkilerin yapraklarından özsu emer. Düşük bağıl hava nemi, popülasyonun yaşamsal faaliyeti üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Zararlı mücadele stratejisi: Zararlıların varlığını ve popülasyon yoğunluğunu belirlemek için bitkilerin düzenli olarak kontrol edilmesine ek olarak, mavi yapışkan tuzaklar yerleştirilmelidir.

Yetkilendirilmiş bitki koruma ürünleri:

- thripslere karşı: DEKA EC / DESHA EC / DENA EC - 30 ml/ha, KARATE EXPRESS WG / NINJA / FORZA - 42-80 g/ha, METEOR - 60-70 ml/100 l su ve NATURALIS - 75-100 ml/ha.
- Kaliforniya thripsine karşı: FURY 10 EC - 0.015%

Domatesler için:

- thripslere karşı: DICARZOL 10 SP - 556 g/ha.
- Kaliforniya thripsine karşı: SYNEIS 480 SC - 10-37.5 ml/ha.

Salatalıklar için:

- tütün thripsine karşı: LANAT 25 WP - 80-100 g/ha.
- Kaliforniya thripsine karşı: SYNEIS 480 SC - 10-25 ml/ha.