

Mart ayının ilk yarısı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.03.2017 Брой: 3/2017



Mart ayının ilk yarısında, tarımsal meteorolojik koşullar artan dinamiklerle karakterize edilecektir. Ay başındaki kısa süreli sıcaklık düşüşünün ardından, Mart ayının ilk haftasında termal koşullarda önemli bir iyileşme beklenmektedir. Normalin üzerinde tahmin edilen ve maksimum değerleri 20°C'ye kadar çıkabilen sıcaklıklar, ülkenin tarım bölgelerindeki sonbaharda ekilen ürünlerde ve erken çiçek açan meyve bahçelerinde vejetasyonun aktifleşmesine yol açacaktır.

Şubat ayı sonundaki, bazı yerlerde 21-23°C'ye (Vidin, Vratsa, Lovech, Veliko Tarnovo, Pazardzhik) ulaşan yüksek maksimum sıcaklıklar, buğday, arpa ve kışlık kanolada vejetatif süreçleri yeniden başlatmış ve çok yıllık plantasyonların bir kısmında zorunlu dormansi (dinlenme) dönemini kesintiye uğratmıştır.

Mart ayının ilk yarısında, tarımsal meteorolojik koşullar artan dinamiklerle karakterize edilecektir. Ay başındaki kısa süreli sıcaklık düşüşünün ardından, Mart ayının ilk haftasında termal koşullarda önemli bir iyileşme beklenmektedir. Normalin üzerinde tahmin edilen ve maksimum değerleri 20°C'ye kadar çıkabilen sıcaklıklar, ülkenin tarım bölgelerindeki sonbaharda ekilen ürünlerde ve erken çiçek açan meyve bahçelerinde vejetasyonun aktifleşmesine yol açacaktır.

İlk on günlük dönemin sonunda ve ikinci on günlük dönemin ilk yarısında, tarımsal meteorolojik koşullar iklim normalleri civarında ve altındaki sıcaklıklar tarafından belirlenecek ve bu da tarım ürünlerinin gelişimini kısıtlayacaktır. Kuzey Bulgaristan'da ve yüksek ovalarda, kar dahil yağışların görülmesi mümkün olduğundan, sonbaharda ekilen ürünlerde vejetasyonun zayıflaması ve durması gözlemlenecektir. Güney Bulgaristan'da ise ortalama günlük sıcaklık değerleri, kışlık tahıl ürünleri ve kışlık kanolanın gelişimi için gerekli olan biyolojik minimuma yakın olacaktır.

Mart ayı ortasına kadar, ülkenin güney bölgelerindeki meyve bahçelerinde erken çiçek açan türlerde (badem, kayısı, şeftali) tomurcuk şişmesi ve tomurcuk patlaması evreleri gerçekleşiyor olacaktır. Bu dönemde, ovalardaki ürünler için kritik minimum sıcaklıklar tahmin edilmemektedir.

Ayın ilk yarısındaki sık yağışlar, ülkenin birçok bölgesinde mevsimlik tarımsal teknik faaliyetlerin - sonbaharda ekilen ürünlerin azotlu mineral gübrelerle üstten gübrelenmesi, ekim öncesi toprak işleme ve erken ilkbahar ürünlerinin (fiğ, yulaf, bezelye, yazlık arpa) ekiminin - zamanında uygulanmasını güçleştirecektir. Meyve bahçelerinde çiçeklenme öncesi ilaçlama yapmak için daha uygun koşullar, Mart ayının ilk haftasında ve ikinci on günlük dönemin başında oluşacaktır.

Kaynak: NIMH-BAS