

'Nisan ayının ilk yarısında meyve bitkileri için kritik minimum sıcaklıklar'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.04.2017 Брой: 4/2017



Ayın başında, meyve ağaçlarının çiçek ve meyve tutumu için negatif minimum sıcaklıklar ve kritik değerlerin (eksi 2°C'nin altı) görülme olasılığının arttığı tahmin ediliyor. Bu dönemde kışlık tahıl ürünleri sap uzaması evresinin başlangıcına girecek. Başarılı şekilde kışı atlatmış kışlık kanola alanlarında tomurcuklanma evresi gerçekleşecek.

Nisan ayının başında agrometeorolojik koşullar nispeten kuru hava ile belirlenecek. Koşullar, mevsimlik agroteknik faaliyetlerin yürütülmesi için uygun olacak; bunların en önemlisi ayçiçeği ekimidir. Güney Bulgaristan'ın birçok yerinde, ayçiçeği ekimi için optimal dönem olan Mart ayının ikinci yarısı kaçırılmıştır. Kuzey Bulgaristan için bu dönemler Nisan ayının ilk on gününe denk gelmektedir.

İlk on günlük dönemde tarım ürünlerinin vejetasyonu orta hızda ilerleyecek, ortalama günlük sıcaklıklar iklim normalleri civarında olacaktır. Ayın başında, meyve ağaçlarının çiçek ve meyve tutumu için negatif minimum sıcaklıklar ve kritik değerlerin (eksi 2°C'nin altı) görülme olasılığının arttığı tahmin ediliyor. Bu dönemde kışlık tahıl ürünleri sap uzaması evresinin başlangıcına girecek. Başarılı şekilde kışı atlatmış kışlık kanola alanlarında tomurcuklanma evresi gerçekleşecek.

İkinci on günlük dönemin ilk yarısında sıcaklıklarda önemli bir artış ve sonbaharda ekilen ürünler ile çok yıllık plantasyonlarda hızlanmış bir gelişim beklenmektedir. Nisan ortasına kadar buğday ve arpa ağırlıklı olarak sap uzaması evresinde olacaktır. Dönem sonunda, kanola alanlarının bir kısmında çiçeklenme evresinin başlangıcı gözlemlenecektir. Mart sonunda ekilen ayçiçeğinde ise çıkış evresi ağırlıkta olacaktır.

Sonraki dönemde beklenen yağışlar, sonbaharda ekilen ürünler ile erkenci ve orta-erkenci ilkbahar ürünlerinde vejetasyonun normal seyri için nem sağlayacaktır. İlkbahar başında, ülkenin çoğunda 50 cm ve 100 cm katmanlardaki toprak nem rezervleri çok iyi durumda olup, tarla kapasitesinin (TK) %90'ının üzerindedir. Tuna Ovası'nda (Kneja, Novachene agrometeoroloji istasyonları) ve Balkan Altı vadilerinde (Kazanlık) bazı yerler istisnadır; bu yerlerde nem rezervi seviyesi daha düşüktür (TK'nın %80'inin altında).

Dönem boyunca, bazı ekonomik açıdan önemli hastalıklara (çiçek yanıklığı, şeftali yaprak kıvrıcıklığı, delikli yaprak lekesi, kabuklu bit, ayva meyve dökümü vb.) ve zararlılara (yaprak galeri güveleri, yaprak bitleri, güveler, hortumlu böcekler vb.) karşı bitki koruma ilaçlaması yapmak için daha uygun koşullar, Nisan ayının birinci on günlük döneminin başında ve sonunda ile ikinci on günlük dönemin ortasında oluşacaktır.

Kaynak: NIMH-BAS