

Nisan, meyve ağaçlarını yine şaşırttı

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.04.2017 Брой: 4/2017



Geçmiş yedi günlük dönemin sonundaki kış hava koşulları, yüksek alanlarda ve Kuzey Bulgaristan'ın bazı yerlerinde kar yağışıyla birlikte, meyve ağaçlarının bir kısmında telafisi mümkün olmayan hasara neden oldu.

Takip eden 21-27 Nisan döneminin çoğu gününde, tarımsal ürünlerin gelişimi, Nisan ayının üçüncü on günlük dönemi için normun altındaki sıcaklıklarda yavaş bir seyirde ilerleyecek. Dönemin ilk yarısında, toprak donları yeniden öngörülmekte olup, bu durum sebze ve tütün fidelerinin sertleştirilmesi sırasında dikkate alınmalıdır.

Nisan ayının ikinci on günlük döneminin sonundaki yaygın yağışlar (ülkenin birçok bölgesinde dönem için ortalama norm olan 35-40 l/m²'yi aşmıştır: Novo Selo - 51 l/m², Vratsa - 37 l/m², Montana - 39 l/m², Veliko Tarnovo - 43 l/m², Ruse - 43 l/m², Silistra - 40 l/m², Dobrich - 37 l/m², Sofia - 50 l/m², Blagoevgrad - 41 l/m², Elhovo - 35 l/m²), 50 cm'lik toprak katmanındaki nem rezervlerinde önemli bir artışa yol açtı. Bu durum, nem açısından kritik aşamalardan olan sapa kalkma ve sapa kalkmadan başaklanmaya geçiş dönemlerindeki buğday ve arpa için olağanüstü önem taşıyacak. Dönem sonunda, en güney bölgelerdeki bazı yerlerde arpa

başaklanma başlangıcı aşamasına girecek. Kanolada kitlesel çiçeklenme gözlenecek, ayçiçeği ve mısırdaki ise çıkış ve yaprak oluşumu görülecek.

Üçüncü on günlük dönemin başındaki serin ve nemli hava, bir dizi fungal hastalığın (meyve ağaçlarında erken kahverengi çürüklük ve kabuk lekesi, asmalarda ekskoryoz, tahıl ürünlerinde septoria yaprak lekesi, soğanda mildiyö vb.) enfeksiyon zemininin artması için bir ön koşul olacaktır.

Dönem boyunca, ülkenin birçok bölgesinde, toprak işleme ve pamuk, yer fıstığı, fasulye, karpuz ve kavun gibi daha geç ekilen termofilik ilkbahar ürünlerinin ekimi için koşullar uygun olmayacaktır.

Kaynak: NIMH-BAS