

Bağlarda Haziran Ayı Bitki Koruma Uygulamaları

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 13.06.2017 Брой: 6/2017



Bu dönemde, asmalar "tam çiçeklenme" fenofazından "bezelye büyüklüğünde tane" - "salkım kapanması" fenofazına kadar olan evrededir.

Dönemin Başlıca Zararlıları

Bağ mildiyösü *Plasmopara viticola*

Külleleme *Oidium tuckeri*

Kurşuni Kүf *Botrytis cinerea*

Salkım güvesi *Lobesia botrana*

Bağ koşnili *Pulvinaria vitis*

Sarı bağ akarı *Schizotetranychus viticola*

Kurşuni Küf

"Tam çiçeklenme" fenofazında, çiçekler ve çiçek sapları üzerinde, patojenin sporlanmasıyla kaplanan kahverengi lekeler oluşur. Bu belirtiler erken kurşuni küf olarak bilinir.

Mücadele stratejisi: Yağmurlu ve sıcak havalarda, çiçeklenmeden hemen sonra, ilk tanelerin görülmesinde ve salkım kapanmasında, ruhsatlı bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılır.

Ruhsatlı bitki koruma ürünleri: arvak 50 WG - 100-150 g/ha; geox WG - 100 g/ha; driza WG - 100-150 g/ha; cabrio top – 0.2%; cantus - 100 g/ha; mevalon - 160-400 ml/ha; proletus 50 WG - 120 g/ha; rebut WG - 100-150 g/ha; sabueso - 100-150 g/ha; synpro - 150 ml/ha; switch 62.5 WG - 0.08%; thiram 80 WG – 0.4%; top plus 70 WP – 0.1%; topsin M 70 WDG – 0.1%; folder 80 WG - 150 g/ha; follow 80 WG / friller 80 WG / flowet 80 WG - 187.5 g/ha; folpan 80 WDG - 0.1 % + ardent 50 SC - 0.015 %; shavit F 72 WDG – 0.2%.

Salkım Güvesi

Haziran ayında zararlıının ikinci nesil kelebekleri uçar. Yumurtalarını bezelye büyüklüğündeki (ilk) tanelerin üzerine bırakırlar. Larvalar, ilk taneleri kemirerek ve tanelerin içini çekirdeklerle birlikte yiyerek zarar verir. Zarar görmüş taneler zayıf ipek ipliklerle bağlanmıştır. Bir larva 7 ila 24 tane zarar verir.

Mücadele stratejisi: İlaçlamalar **ETK'de** (Ekonomik Zarar Eşiği) yapılmalıdır: sofralık çeşitler için *100 ilk tanede 6-7 larva*, şaraplık çeşitler için ise *100 ilk tanede 11-12 larva*.

Ruhsatlı bitki koruma ürünleri: aficar 100 EC – 40 ml/ha; dascor 440 - 50 ml/ha; decis 100 EC - 12.5-17.5 ml/ha; dipel 2 X - 0.1 %; dukat 25 EC - 70 ml/ha; efcimetrim 10 EC / cyper 10 - 40 ml/ha; karate zeon 5 CS – 0.02%; coragen 20 SC - 18 ml/ha; luzindo 40 WG - 0.025 kg/ha; mageos - 10 g/ha; maltoato - 40-60 ml/ha; nexcid 015 CS - 0.03 %; nurelle D / chlorsirin 550 EC / samba - 60 ml/ha; runner 240 SC - 0.04 %; rapax - 75-100 ml/ha; reldan 40 EC - 0.12 %; sineis 480 SC - 4-18 ml/ha; sumi alpha 5 EC / sumicidin 5 EC - 0.025 %; forey 48 B - 0.15 %; fury 10 EC - 0.0125 %; ciklon 10 EC - 40 ml/ha; cyperfor 100 EC - 40 ml/ha; citrin max /

cyperkyl 500 EC / cypert 500 EC / poli 500 EC - 6 ml/ha; sherpa 100 EW / aficar 100 / cyperfor 100 EW / ciklon 100 EW - 25 ml/ha; sherpa 100 EC - 40 ml/ha.