

'Meyve bahçelerinde dolu zararı durumunda alınacak bitki koruma önlemleri'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



Dolu fırtınaları sırasında yapraklar yırtılır ve sürgünler, ince dallar ile dallar yaralanır. Hasar, özellikle meyve büyüme ve olgunlaşma döneminde tehlikelidir. Hasarın boyutu, dolu yoğunluğuna ve süresine ve elbette etkilenen ürüne bağlıdır.

Bir dolu fırtınasından sonraki ilk önlem, dalları hemen buz kütesinden temizlemek ve en kısa sürede uygun bakır içerikli fungusitlerle muamele etmektir. Meyve veren veya genç olmalarına bakılmaksızın tüm ağaçlar tedavi edilmelidir. Dolunun neden olduğu yaralar, mantar ve bakteri hastalıklarıyla enfeksiyon için önemli bir ön koşuldur.

Dolu tarafından düşürülen meyvelerin hızla toplanması ve uygunluğuna göre değerlendirilmesi tavsiye edilir, ancak hiçbir koşulda toprak yüzeyinde çürümeye bırakılmamalıdır. Ağaçlardaki yaralar çok tehlikelidir çünkü derin katmanları etkilerlerse zor iyileşirler. Daha büyük dolu durumunda, bazen çok geniş olan kabuk yırtılmaları meydana gelir ve ciddi şekilde etkilenen ağaçlar ölür. Bu nedenle, bir dolu fırtınasından sonra yaralar düzeltilmeli, ağır hasar görmüş kısımlar çıkarılmalı ve yüzeyler yağlı boya ile kaplanmalıdır. Meyve ağaçları hızla iyileşme kapasitesine sahiptir; bu nedenle, mekanik hasardan sonra hafif yaralanmalı dallar bırakılır ve iyileşmezlerse kış budaması sırasında kesilir.

Dolu fırtınasından sonra meyve ağaçlarında hastalık ve zararlılara karşı bitki korumaya devam etmek, kabuklu bit, elma iç kurdu, yaprak biti ve diğerlerinden kaynaklanan ek hasarı önlemek için gereklidir.