

Bağlarda Temmuz Ayında Bitki Koruma Bakımı

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



Bu dönemde, asmalar fenolojik olarak erkenci çeşitlerde “çiçeklenme sonu” ile “tane olumunun başlangıcı” evreleri arasındadır.

Dönemin başlıca zararlıları

Bağ mildiyözü *Plasmopara viticola*

Külleleme *Oidium tuckeri*

Kurşuni küf *Botrytis cinerea*

Bakteriyel ur *Agrobacterium vitis*

Salkım güvesi *Lobesia botrana*

Filizkıran güvesi *Theresimima ampellophaga*

Bağ kabuklubiti *Pulvinaria vitis*

Sarı bağ akarı *Schizotetranychus viticola*

Bakteriyel ur

Hastalıklı bitkilerde odunsu kısımlarda, toprak yüzeyine yakın veya hemen altında şişkinlikler (urlar) gözlemlenir. Hasta bitkilerde gelişme geriliği, klorotik yapraklar görülür ve soğuk bir kış sırasında kolayca donarak ölürler.

Mücadele stratejisi:

Temmuz ayında, hastalık belirtileri gösteren asmalar işaretlenmelidir.

Bağ kabuklubiti

Larva çıkışı Temmuz ayının ilk yarısında devam eder. Yaprak, sürgün ve salkımlardan özsu emerek zarar verirler. Bir kez gömlek değiştirir, belirli bir süre beslenir, ardından beslenme yerlerini terk ederek kışlama yerlerine geçerler. Zarar sonucu asmalar zayıflar.

Mücadele stratejisi:

Kimyasal mücadele genç larvalara karşı yapılır.

Ruhsatlı bitki koruma ürünü:

movento 100 sc - 0.075-0.095%;

