

Geç kahverengi çürüklük /*Monilia fructigena*/

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.07.2017 Брой: 7/2017



Yaz aylarında patojenin saldırı insidansı azalır. Hastalığın gelişimi için uygun koşullarda (artmış nem ve orta derecede yüksek sıcaklıklar), meyvelerde kahverengi lekeler ortaya çıkar, bunlar genişler ve tüm meyveyi kaplayabilir. Hasar görmüş dokular kahverengi, çürük, sarımsı beyaz veya kül grubu spor kümeleriyle kaplı konsantrik halkalara sahiptir. Düşük nemde, tüm meyve buruşur ve mumyalaşır.

Zararlı Mücadele Stratejisi

Uygulama, uygun koşullarda ve hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde gerçekleştirilir.

Yetkilendirilmiş Bitki Koruma Ürünleri:

Difcor 250 SC - 20 ml/da, Captan 80 WG - 150-180 g/da, Luna Experience - 63-75 ml/da, Prolectus 50 WG - 80-120 g/da, Signum - 60-75 g/da, Systhane 20 EW - 12.5-30.0 ml/da, Systhane Ekosom EW - 65–200 ml/da, Chorus 50 WG - 0.045%.