

Ağustos ayının ikinci yarısı için meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.08.2017 Брой: 8/2017



Ülkenin güneybatı bölgelerinde (Petrich bölgesi) Ağustos ayının ilk yarısında yaşanan yüksek sıcaklıklar sonucunda, beyaz şarap çeşitleri Muscat Ottonel ve Chardonnay'ın üzüm hasadı, olağan tarihlerden daha erken başladı.

Dönemin ilk yarısında, normalin üzerinde seyretmesi öngörülen sıcaklıklar, geç tarım ürünlerinin gelişiminin son aşamalarını hızlandıracak. İkinci on günlük dönemin sonunda, orta-erkenci mısır hibritlerinde mum ve tam olgunluk gözlenecek. Bu dönemde, orta-geççi hibritlerde süt olumu ve mum olumuna geçiş gerçekleşecek, geççi hibritlerde ise tane dolumu devam edecek. Ayçiçeğinde, tarlalarda teknik olgunluk hakim olacak. Üçüncü on günlük dönemin başında, soyada olgunlaşma evresi, pamukta koza açılmasının başlangıcı ve çeltikte süt olumu

evresi gözlenecek. Güney Bulgaristan'daki erkenci beyaz şarap üzümü çeşitlerinin bir kısmı teknolojik olgunluğa girecek.

Ülkenin güneybatı bölgelerinde (Petrich bölgesi) Ağustos ayının ilk yarısında yaşanan yüksek sıcaklıklar sonucunda, beyaz şarap çeşitleri Muscat Ottonel ve Chardonnay'ın üzüm hasadı, olağan tarihlerden daha erken başladı.

Dönemin ikinci yarısında, sıcaklıklarda önemli bir düşüş ve agrometeorolojik koşullarda bir değişiklik öngörülmektedir. Ülkenin doğu ve güney bölgelerindeki bazı yazlık ürünler için geç kalmış olan beklenen yağışlar, işlenebilir toprak katmanındaki su-fiziksel durumu iyileştirecek ve bu da, kanola ekimi için ayrılan alanlarda derin sürüm ve ekim öncesi toprak işlemenin daha kaliteli yapılması için bir ön koşul oluşturacak. Ağustos ayının üçüncü on günlük döneminde, kışlık kanola ekimi için agroteknik zaman çerçevesi başlar.

Güney Bulgaristan'da yer yer başlamış olan ayçiçeği hasadının yürütülmesi için uygun koşullar, dönemin ilk yarısında oluşacak.

Kaynak: NIMH-BAS