

Bağlarda Ağustos ayında bitki koruma uygulamaları

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 28.08.2017 Брой: 8/2017



Bu dönemde, asmalar "renk değişimi" ile "tane olgunlaşması" fenofazlarındadır.

Dönemin Başlıca Zararlıları

Salkım küfü (Mildiyö) *Plasmopara viticola*

Külleme *Oidium tuckeri*

Kurşuni küf *Botrytis cinerea*

Salkım güvesi *Lobesia botrana*

Sarı asma akarı *Schizotetranychus viticola*

Salkım Güvesi

Ağustos ayında, Eylül'ün ikinci yarısına kadar zararlının üçüncü nesil kelebeklerinin uçuşu devam eder. Bu neslin larvaları, olgunlaşan ve olgunlaşmış üzüm tanelerini ipek ipliklerle bağlayarak zarar verir. Meydana gelen zarar sonucu, kurşuni küf etmeninin girişi için uygun koşullar oluşur.

Mücadele Stratejisi:

EKZ: sofralık çeşitlerde *100 salkımda 7-8 larva*, şaraplık çeşitlerde ise *100 salkımda 10-12 larva* olduğunda ilaçlama yapılır.

Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri:

aficar 100 EC – 40 ml/ha; daskor 440 - 50 ml/ha; decis 100 EC - 12.5-17.5 ml/ha; dipel 2 X - 0.1%; dukat 25 EC - 70 ml/ha; efcimetrin 10 EC/cyper 10 - 40 ml/ha; karate zeon 5 CS – 0.02%; coragen 20 SC - 18 ml/ha; luzindo 40 WG - 0.025 kg/ha; mageos - 10 g/ha; maltoato - 40-60 ml/ha; neksid 015 CS - 0.03%; nurelle D /hlorsirin 550 EC /sanmba - 60 ml/ha; raner 240 SC - 0.04%; rapax - 75-100 ml/ha; reldan 40 EC - 0.12%; sineis 480 SC - 4-18 ml/ha; sumi alpha 5 EC/sumicidin 5 EC - 0.025%; forey 48 B - 0.15%; fury 10 EC - 0.0125%; ciklon 10 EC - 40 ml/ha; ciperfor 100 EC - 40 ml/ha; citrin max /ciperkil 500 EC /cipert 500 EC /poli 500 EC - 6 ml/ha; sherpa 100 EW /aficar 100 /ciperfor 100 EW /ciklon 100 EW - 25 ml/ha; sherpa 100 EC - 40 ml/ha.

Sarı Asma Akarı

Ağustos ayında, birkaç neslin üst üste binen populasyonları gözlenir. Yoğun bulaşma durumunda, asma yaprak ayası deforme olur, pürüzlü bir hal alır ve ezildiğinde çıtırdar. 32-35°C'nin üzerindeki sıcaklıklar akar populasyonları için öldürücüdür. Eylül ayının ilk yarısında, dişiler kışlamak için asma bitkilerinin eski kabukları altına geçer.

Mücadele Stratejisi:

EKZ - yaprak başına 9-10 birey eşiğine ulaşıldığında - Ağustos sonuna kadar - ergin ve larvalara karşı ilaçlama yapılır.

Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri:

apolo 50 SC - 30-40 ml/ha; envidor 240 SC - 40 ml/ha; masai WP - 25 g/ha; nisoran 5 EC - 0.05%; ortus 5 SC /danitron 5 SC - 0.05%; sanmite 20 WP - 0.05%.