

Kolza yaprak testere sineği – *Anthalia rosae*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 08.10.2017 Брой: 10/2017



Zarar:

Sonbaharda, zararlının üçüncü nesli gelişir. Erişkin ekin arıları ekim ayı sonuna kadar uçar ve yumurtalarını kotiledonlara ve ilk gerçek yapraklara bırakır. Genç larvalar yaprakların alt yüzeyinde beslenerek onları küçük çukurlar şeklinde kemirir. Büyüdükçe, yaprak ayasında delikler açarlar ve bu delikler giderek genişler,

kenardan beslenme zararına neden olurlar ve daha sonra sadece ana damarları bırakarak tüm yaprak ayasını tüketirler. Gelişimlerini tamamladıktan sonra, larvalar toprağa girer ve kışı geçirmek için orada kalır.

Mücadele:

Kolza ekin arısı ile mücadele, 2–3 larva/m² veya 2–3 zarar görmüş bitki/m² ekonomik eşikinde yapılır.

Mücadele için kayıtlı insektisitler:

Karate Zeon 5 CS – 15

ml/da; Cytrin Max – 5 ml/da, Decis 100 EC - 6.3 ml/da, Dukat 25 EC - 20 ml/da, Pirinex Supreme 3W - 60 ml/da