

Kolza sap pire böceđi – *Psylloides Chrysocephala*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.10.2017 Брой: 10/2017



Zarar:

Kolza kök pire böceđi her yerde yaygındır ve yüksek popülasyon yoğunluđunda büyük zararlara neden olur. Zararlı yılda bir nesil verir. Yumurta, larva ve ergin böcek olarak kışı geçirir.

Eylül ayında erginler yoğun bir şekilde beslenmeye başlar ve Eylül sonundan Aralık ortasına kadar yumurtalarını bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar başlangıçta gövdelerin epidermisini, daha sonra yaprak saplarını ve yaprakların orta damarlarını oyar. Larvaların bir kısmı ilkbaharda yumurtadan çıkar.

Kolza kök pire böceğinin yakın bir akrabası Küçük kolza kök pire böceğidir. Kanola üzerindeki diğer zararlı türler şunlardır: siyah, açık bacaklı, dalgalı çizgili, keten, kenevir ve diğer pire böceği türleri.

Mücadele:

3 Kimyasal mücadele ekonomik eşikte uygulanır: Çıkışta 2 ergin/m²; 3. yaprak görüldükten sonra 4 ergin/m²; bitki başına 3–5 larva.

Mücadele için Kayıtlı İnsektisitler:

Mavrik 2 F – 30 ml/da; Citrin Max – 5 ml/da; Deka EC – 30 ml/da; Decis 100 EC – 5 ml/da; Dukat 25 EC – 30 ml/da; Mageos – 5 g/da; Nurelle D – 60 ml/da; Pirinex Supreme 3V – 60 ml/da; Sherpa 100 EW – 25 ml/da.