

Kasım ayı için meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2017 Брой: 11/2017



Kasım ayında tarımsal meteorolojik koşullar, iklim normalleri civarında ve altındaki sıcaklıklarla belirlenecek. Kasım başında, normalin altında tahmin edilen termal koşullar, sonbaharda ekilen ürünlerin gelişimini kısıtlayacak. İlk on günlük dönemin ikinci yarısında sıcaklıklarda bir artış ve buğday, arpa ile kışlık kanolada vejetasyon süreçlerinin aktivasyonu bekleniyor.

İlk ve ikinci on günlük dönemlerin çoğu gününde, sık yağışlarla tahmin edilen kararsız hava durumu, mevsimlik tarımsal teknik faaliyetlerin uygulanmasını, bunların en önemlisi olan buğday ekiminin tamamlanmasını zorlaştıracak. Ekim ayının son haftasında düşen ve ülkenin birçok bölgesinde aylık normları aşan yağışlar (Veliko Tırnovo – 60 l/m², Sviştov – 62 l/m², Kazanlık – 75 l/m², Hasköy – 65 l/m², Eski Zağra – 60 l/m², Sliven – 74 l/m², Elhovo – 85 l/m², Karnobat – 210 l/m², Burgas – 92 l/m²), ülkenin bir kısım tarla alanlarında kışlık tahıl ürünlerinin ekimi için tarımsal teknik takvim sürelerinin kaçırılmasının nedeni oldu.

Kasım başında, normalin altında tahmin edilen termal koşullar, sonbaharda ekilen ürünlerin gelişimini kısıtlayacak. İlk on günlük dönemin ikinci yarısında sıcaklıklarda bir artış ve buğday, arpa ile kışlık kanolada vejetasyon süreçlerinin aktivasyonu bekleniyor.

Kasım ayının ikinci yarısında, Kuzey Bulgaristan için tahmin edilen ortalama günlük sıcaklık değerleri, kışlık tahıl ürünlerinin gelişimi için gerekli biyolojik minimuma yakın sınırlar içinde olacak. Yüksek tarlalarda ve Balkan Öncesi'nde, kar yağışının dışlanmadığı yerlerde, sonbaharda ekilen ürünlerde vejetasyonun durması gözlemlenecek.

Ayın ikinci yarısında kışlık tahıl ürünleri ve kışlık kanolada vejetasyon için koşullar, esas olarak ülkenin güney bölgelerinde ve Karadeniz kıyısı boyunca oluşacak.

Kasım sonunda, Ekim ayında ekilen buğday ve arpada kardeşlenme aşaması baskın olacak. Kasım ayında ekilen ürünlerde ise çıkış ve ilk yaprak oluşum aşaması gözlemlenecek. Kasım ayında, tarımsal teknik takvim sürelerinden sonra yapılan kışlık tahıl ürünleri ekimi, ürünlerin sonbahar vejetasyonu sonuna kadar kardeşlenme aşamasına girme olanaklarını sınırlandırır. Bu aşamada bitkiler artan soğuk dayanıklılığına sahiptir, bu da büyük ölçüde başarılı kışlamalarını sağlar.

Kasım sonunda, tarımsal teknik takvim süresi içinde – Eylül ayında ekilen kışlık kanolada, rozet oluşum aşaması (6–7 yaprak) gözlemlenecek. Ay boyunca, tarım ürünleri için kritik minimum sıcaklıklar tahmin edilmemektedir.

Kasım ayında meyve ağaçları dikimi için daha uygun koşullar, birincinin sonunda, ikincinin başında ve üçüncü on günlük dönemin çoğu gününde oluşacak.

Kaynak: NIMH-BAS