

'Ekili sonbahar ürünlerinde vejetatif süreçlerin aktivasyonu'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.11.2017 Брой: 11/2017



Kasım ayının ikinci on günlük döneminin başında görülen yüksek sıcaklıklar, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Varna, Elhovo, Sandanski, Kırcaali ve Loveç bölgesinde bazı yerlerde maksimum değerlerin 19-20°C'ye, hatta 22°C'ye kadar çıkması, ekilen sonbahar ürünlerindeki vejetatif süreçleri harekete geçirmiştir.

Kasım ayının ikinci on günlük dönemi boyunca, ülkenin tarla bölgelerinde buğday, arpa ve kışlık kanolanın gelişimi, dönem için belirlenen iklim normalleri civarında ve üzerindeki sıcaklıklarda ilerleyecektir.

Dönemin ikinci yarısının sonunda bir soğuma ve tarımsal meteorolojik koşullarda önemli bir değişiklik öngörülmektedir. Kar yağışının beklendiği daha yüksek tarlalarda, sonbahar ürünlerinde vejetasyonun

yavaşlaması ve durması gerçekleşecektir. Kasım ayının üçüncü on günlük döneminin başında, ülkenin tarla bölgelerinin çoğunda, öngörülen ortalama günlük sıcaklık değerlerinin buğday, arpa ve kışlık kanolanın gelişimi için gerekli olan biyolojik minimumu aşması beklenmemektedir. Dönem sonunda, ekim ayı içerisinde agroteknik zaman diliminde ekilen kışlık tahıl ürünlerinde, kardeşlenme aşaması baskın olacaktır. Kasım ayının ilk haftasında ekilen ürünlerde ise çıkış ve yaprak oluşumu aşamaları gözlemlenecektir. Sonbahar başında ekilen kışlık kanolada ise rozet aşaması (6-7 yaprak) gözlemlenecektir.

Ülkenin büyük bölümünde toprak su rezervleri oldukça iyi durumdadır. Dönem boyunca beklenen yağışlar, 50 ve 100 cm toprak katmanlarındaki sonbahar nem rezervlerini artıracaktır. Ülkenin çoğunda bu rezervler oldukça iyi olup, tarla kapasitesinin (FC) %80-85'inin üzerinde seviyelerdedir.

Kaynak: NIMH-BAS