

'Meyve ağaçları dikimi için uygun koşullar'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.11.2017 Брой: 11/2017



Ayın sonuna kadar tarımsal meteorolojik koşullar normalin üzerindeki sıcaklıklardan etkilenecek. Ülkenin tarla alanlarında, tahmin edilen ortalama günlük sıcaklık değerleri, buğday, arpa ve kışlık kanolanın gelişimi için gerekli olan biyolojik minimumu önemli ölçüde aşacak. Mevsime göre beklenen ılıman hava, kışlık tahıl ürünleri ve kışlık kanolanın sonbahar vejetasyonunu uzatacak ve geç ekilen Kasım ekim alanlarındaki gelişimde ilerleme için bir ön koşul oluşturacak.

Sonbahar ürünlerinde vejetasyonun azalması ve durması

30 Kasım'a kadar sıcaklık koşullarında bir düşüş ve normalleşme öngörülüyor, bu da sonbahar ürünlerinde vejetasyonun azalmasına ve yüksek tarlalarda durmasına yol açacak. Üçüncü on günlük dönemin sonunda,

таримсал техник заман дилими ичинде екilen буğday ve арpa чоğунлукла кардешленме ашамасында олацак. Касым башинда екilen алаңларда үчүңцү япрак ашамасы, ай ортасында екilenлерде ise чыкыш ашамасы баскын олацак. Каноланын буюк бир кысында розет ашамасы (6–7 япрак) гозлеmlenecek. Гүнеyдоғу бөлгелеринин бази yerлеринде (Sliven тарым истasyonu) канола биткйлеринин boyу 25–27 cm'ye, розет ise 7–8 япраға улашмыш durumда.

Айын sonunda meyve ағачларыннн дикilmesi ve баҳçelerde sonbahar битки корума илаçламаларыннн yapılması ичин uygun кошullар олацак.

Kaynak: NIMH-BAS