

Şubat başında ısınma

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.01.2018 Брой: 1/2018



Ocak ayı sonunda, Kuzey Bulgaristan ve yüksek ovalarda (Sofya, Dragoman, Kneja, Nikolaevo, Şumen, Dve Mogili ve İsperih) bazı yerlerde -13 ila -15°C aralığında negatif sıcaklıklar kaydedildi. Bu değerler, kardeşlenme aşamasındaki kışlık tahıl ürünlerinin kışlama eşiklerinin üzerindedir, ancak kar örtüsünün olmaması veya düzensiz ve parçalı olması ve uzun süre devam etmesi koşullarında, bu sıcaklıklar özellikle arpa olmak üzere, üçüncü yaprak aşamasında vejetasyonu durmuş olan bitki örtüsü için tehlikelidir.

Ocak ayının üçüncü on günlük döneminin ortasındaki donlu havanın ardından, şubat başında tarımsal meteorolojik koşullar bir değişim geçirecek. Ayın sonunda sıcaklıklarda bir artış bekleniyor, ancak tarla alanlarının çoğunda ortalama günlük değerleri, sonbaharda ekilen ürünleri dinlenme halinde tutacak sınırlar içinde kalacak. İstisnalar, Tuna Ovası'nın kuzeybatı kesiminde ve aşırı güneybatı bölgelerde meydana gelecek

ve burada kışlık tahıl ürünlerinde vejetatif süreçlerin yeniden başlaması için gereken biyolojik minimuma yakın olacaklar.

Dönem boyunca yağış beklenmiyor ve koşullar, meyve bahçelerinde bir dizi patojenin kışlama formlarına karşı (çiçek yanıklığı [erken kahverengi çürüklük], yaprak deliği hastalığı, şeftali yaprak kıvrıcıklığı vb.) budama ve kış bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için uygun olacak.

Kaynak: NIMH-BAS