

Şeftalide kıvrıcıklık

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.02.2019 Брой: 2/2019



Etmen: *Tafrina deformans* – mantar

Konukçular: şeftali, nektarin, kayısı

Belirtiler:

Yaprakların üst yüzeyinde, alt yüzeyde çökük olan, tekil veya çoklu, soluk yeşil, soluk sarı veya kırmızı şişkinlikler. Dokular yoğun, pürüzlü ve dalgalı bir şekilde kırıktır;

Zarar tüm yaprak ayasını etkileyebilir, bunun sonucunda yapraklar nekroza uğrar ve dökülür.

Enfekte dokular üzerinde beyazımsı bir tabaka oluşur;

Şişkinlikler sürgünler ve meyveler üzerinde de oluşabilir.

Yaşam Döngüsü

Etmen, askosporlar halinde tomurcuk pulları arasında veya enfekteli sürgünlerin kabuğu üzerinde kışı geçirir.

Enfeksiyonlar, yaprak tomurcuklarının patlamasıyla birlikte, erken ilkbaharda gerçekleşir.

Mücadele:

Sonbahar-kış ilaçlamaları. Eğer sonbahar ilaçlaması yapılmamışsa, tomurcuk şişmesine kadar %1'lik Bordo

Bulamacı ile mücadele yapılabilir, bu aynı zamanda **çiçek yanıklığı (erken kahverengi çürüklük) ve sert çekirdekli meyvelerde delik hastalığı etmenlerine** karşı da etkilidir.