

Şubat ayında sıcaklıklar iklim normallerinin üzerinde, ancak biyolojik minimumun altında olacak

Автор(и): Растителна защита

Дата: 12.02.2018 Брой: 2/2018



Şubat ayının ilk on günlük döneminin çoğu gününde, agrometeorolojik koşullar, iklim normallerinin üzerinde, ancak sonbaharda ekilen ürünlerde vejetasyon süreçlerinin yeniden başlaması için gerekli olan biyolojik minimumun altındaki sıcaklıklarla belirlenecektir. İstisnalar, daha yüksek sıcaklıkların tahmin edildiği Doğu Bulgaristan'da görülecektir. Ayın başında, doğu bölgelerindeki bazı yerlerde, buğday ve arpada zayıf bir şekilde ifade edilen vejetasyon için koşullar oluşacak, ancak bu, ürünlerin fenolojik durumunda bir değişikliğe yol açmayacaktır.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerde, aylık normallere yakın tahmin edilen sıcaklıklar, ülkenin çoğu bölgesinde kışlayan tarım ürünlerini dinlenme halinde tutacaktır. İstisnalar, Şubat ayının üçüncü on günlük döneminde, kışlık tahıl ürünlerinin bir kısmında yaşamsal süreçlerin aktif hale gelmesi ve bazı meyve ürünlerinde zorunlu dinlenmenin bozulması için koşulların oluşacağı güney bölgelerde gözlemlenecektir. Şubat sonunda, erken çiçek açan türlerde (badem, kayısı, şeftali) tomurcuk şişmesi gözlenecek ve Güneybatı Bulgaristan'daki bazı yerlerde meyve tomurcuklarının patlamaya başlaması görülecektir.

Şubat ayında, eksi 14°C'ye kadar düşen tahmin edilen minimum sıcaklıklar, kardeşlenme aşamasına girmiş kışlık tahıl ürünleri ve rozet aşamasındaki kanola için kritik eşiklerin üzerindedir. Bu değerler, kar örtüsüz koşullarda ve daha uzun süreli kalıcılık durumunda, sadece üçüncü yaprak aşamasında kışlayan geç ekilmiş ürünler için risk oluşturacaktır.

Beklenen yağışlar, aylık normun çevresinde ve üzerinde olarak, sonbahar-kış toprak nem rezervlerini iki metrelik toprak katmanında da artıracaktır. Ocak ayında, ülkenin çoğu bölgesinde buğday tarlalarındaki bir metrelik katmandaki toprak nem rezervleri tarla kapasitesinin %90'ının üzerindeydi.

Bağlarda ve meyve bahçelerinde budama, meyve ürünlerinde kışlık bitki koruma uygulamaları ve sonbaharda ekilen ürünlerin azotlu mineral gübrelerle üst gübrenmesi için daha uygun koşullar, Şubat ayının ilk on günlük döneminin başında ve ikinci on günlük dönemin ilk yarısında gerçekleşecektir.

Kuzey Bulgaristan'da kar yağışı, kar örtüsü oluşumu ve sonbaharda ekilen ürünlerin kışlama koşullarında iyileşme beklenmektedir. Bu yıl, karsız kışa rağmen, çoğu kışlık tahıl ürününün genel durumu iyi olarak değerlendirilmektedir. Buğdayda hakim aşama kardeşlenmedir ve geç ekilmiş, kardeşlenmemiş kışlık tahıl ürünlerinin küçük bir oranında şu ana kadar don hasarı tespit edilmemiştir.

Şubat ayının ilk haftasındaki yağışlar ve sonraki dönemde beklenen yağışlar, üst toprak katmanlarının su basmasını ve sonbaharda ekilen ürünlerin azotlu mineral gübrelerle üst gübrenmesi için elverişsiz koşulları sürdürecektir.

Şubat ortasında, koşullar bağlarda ve meyve bahçelerinde budama işlemlerine izin verecektir.

Bağlarda, ekskoryoz hastalığının (***Phomopsis viticola***) oluşumunun erken teşhisi için bir inceleme yapılması ve patojenden etkilenen sürgünlerin zamanında kesilip imha edilmesi, ardından işlemlerden sonra aletlerin dezenfekte edilmesi tavsiye edilir. Hastalığın semptomları, vejetasyon dışı dönemde olgun sürgünlerde gözlemlenir – birinci ve ikinci boğum aralarının tabanındaki kabuk beyazlaşır ve küçük siyah noktalarla kaplanır.

Kaynak: NIMH-BAS