

'Buğday ve arpada ilkbahar bakımı'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.02.2018 Брой: 2/2018



Buğday ve arpada ilkbahar-yaz vejetasyon döneminde mikro ve makro element eksikliği, kalitesi düşük daha az verime yol açar. Bitki büyümesi yavaşlar ve bitkiler gelişimlerinde önemli ölçüde geri kalır.

Mangan, çinko ve bakır eksikliği aynı koşullarda ortaya çıkar: humusça zengin, kumlu, gevşek topraklar, yüksek pH değeri, kuraklık veya soğuk ve nem.

Mangan eksikliği, yaprakların sararması, yaprak üzerinde siyah lekeler, ana damarlar arasında açık yeşil damarlar ve kalitenin bozulmasıyla kendini gösterir.

Çinko eksikliği, klorotik çizgiler, turuncu renklenme, bodur büyüme ve küçük yapraklarla kendini gösterir.

Bakır eksikliği, kıvrılmış bayrak yaprağı ve kıvrılmış genç yapraklar, spiral şeklinde ve sarkık yaprak uçları, (kısmen) boş başaklar, zayıf tane oluşumu ve bodur bitkilerle ifade edilir.

Buğday ve arpanın dengeli beslenmesi, asimile edilebilir formda gerekli mikro elementlerin yanı sıra metabolik süreçleri aktive etmek için yeterli miktarda makro element içeren yaprak gübrelemesini içermelidir.

2018 tarım sezonunda da buğday ve arpa üreticileri, yaprak besleme uzmanı Lebosol Bulgaristan'ın ekibine ve ürünlerine güvenebilecekler.

Şirketin portföyü ne sunuyor?

Cereal Mix SC ürünü, bakır, mangan, çinko ve magnezyum içeren sıvı bir mikro element karışımıdır. 150 ila 200 ml/ha dozunda uygulanır ve uygulama sonrasında daha yüksek verim potansiyeli, daha sağlıklı bitkiler, gerekli mikro elementlerin sağlanması ve artan protein içeriği bekleyebilirsiniz.

Bir diğer seçenek ise **QuadroS SC** – bakır (Cu), mangan (Mn), çinko (Zn) ve kükürt (S) içeren sıvı bir mikro element karışımı – ile gübrelemedir. 75 ila 150 ml/ha dozunda yapraktan uygulanarak bitkilere kükürt sağlanır, böylece temel gübreler değerlendirilir ve sonuç olarak sağlıklı bitkiler ve iyi, kaliteli verimler elde edersiniz.

Tahıl ürünlerinin bakımında Lebosol'un bir diğer ürünü olan **Triple SC**'ye de güvenebilirsiniz. İçeriğinde mangan ağırlıklı olmak üzere bakır, mangan ve çinko bulunur. 75 ila 100 ml/ha dozunda uygulanır. Bir diğer alternatif ise, maksimum içeriğe sahip üç element (bakır, mangan ve çinko) içeren sıvı bir mikro element karışımı olan **TriMax SC** ile uygulamadır. 100 ila 150 ml/ha dozunda ürün, stabil verim, yüksek kaliteli tane ve yüksek protein içeriğine katkıda bulunur.

Yukarıda bahsedilen tüm ürünler, kardeşlenme döneminden sap uzamasının başlangıcına kadar uygulanır.

Başaklanma döneminde, Lebosol Bulgaristan birkaç yüksek etkili çözüm sunar: **Ammonium TS 200** – kükürt içeren bir azotlu gübre çözeltisi. 300 ila 500 ml/ha dozunda uygulanır. **VITALoSol Gold CK**, bakır (Cu), mangan (Mn) ve yüksek kükürt (S) içeriğine sahip sıvı bir mikro element karışımıdır. 150 ila 300 ml/ha dozunda uygulanarak verimi ve ürün kalitesini artırır. **Nutriplan 36** ile hektar başına 500 ml dozunda, buğdayın ekmeklik kalite parametrelerini ve protein içeriğini iyileştirebilirsiniz.

2018 ilkbahar kampanyası sırasında öngörülebilir sonuçlar sağlayın ve Lebosol Bulgaristan'ın ürün yelpazesine ve uzmanlarının görüşüne güvenin.