

Yaygın tarla faresinin istilas1 ekinleri tehdit ediyor

Автор(и): ДЗИ в гр. Ген. Тошево

Дата: 18.02.2018 Брой: 2/2018



Tarla faresi (*Microtus arvalis* Pallas), apı 3-5 cm olan toprak yuvalarda yařar. Yazın daha alak ve nemli alanları tercih ederken, kışın ise daha kuru ve iyi drene olanları seer. Koloniler halinde yařar ve yuvalarını yaklaşık 30 cm derinlięe inřa eder. Tek bir diři, 90-100 metrekarelik bir alanı mesken tutar. Yılda 4-6 kez, her seferinde 4-7 yavru doęurur. Gebelik 20-21 gn srer. Bir sonraki dllenme, doęum gnnde gerekleřebilir. Yavrular, doęumdan 45 gn sonra cinsel olgunluęa ulařır. reme řubat-Mart aylarında bařlar ve Haziran ayında zirveye ulařır.

Sıcak ve neredeyse karsız geen kış, lkemizde tarla faresinin geliřimi iin elverişli kořullar yaratmıřtır. řubat bařında Dobruca'daki buęday ekim alanlarında yapılan arařtırmalar, bazı blgelerde, zellikle Karadeniz kıyısı

boyunca, zararlı popülasyonunun dekar başına 5-6 aktif koloniye ulaştığını göstermektedir. Bunlar çoğunlukla yonca tarlalarının yakınında bulunan alanlardır.

Mevcut iklim koşulları, ekili alanların aktif koloni varlığı açısından kapsamlı bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir. Alanlar, güzergah boyunca yapılan bir araştırmayla kontrol edilirken, aynı zamanda koloni girişleri toprakla kapatılır. Birkaç gün sonra, kolonilerin aktivitesini belirlemek için ikinci bir kontrol gerçekleştirilir.

Dekar başına 1 aktif koloni olduğunda yemleme yapılması önerilir. Yemler, daha sonra toprakla kapatılması gereken yuva girişlerine yerleştirilir. Mücadele için hazır yemlerin - Phostoxin/%50%/ peletlerin - kullanılması tavsiye edilir. Bunları yerleştirirken, yüksek derecede toksik maddelerle çalışma gerekliliklerine uyulması zorunludur.