

Mart başında tarımsal meteorolojik koşulların iyileşmesi

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.03.2018 Брой: 3/2018



Şubat sonu ve Mart başındaki donlu hava, eksi 19-22°C aralığındaki kritik sıcaklıklarla (Sevlievo -25°C, Kneja -21°C, Kazanlak -19°C, Kyustendil -19°C, Chirpan -19°C, Stara Zagora -22°C), kışlayan tarım ürünlerinden bazılarının kışa dayanıklılığını test etti. Erken çiçek açan meyve ağaçlarının (badem, şeftali) çiçek tomurcuklarında, özellikle de çiçek tomurcuğu ve çiçeklenme aşamalarına girmiş olanlarda don hasarı beklenmektedir. Eksi 17-18°C'nin altında sıcaklıkların kaydedildiği bölgelerde, sofralık üzüm çeşitlerinde de hasar ihtimal dışı değildir.

Takip eden dönemde tarımsal meteorolojik koşullar önemli bir değişim geçirecektir. Sıcaklıklarda, yağışlarda ve kar erimesinde bir artış öngörülmekte olup, bu da üst toprak katmanlarının suya doymasına yol açacaktır. Bazı

tarla alanlarında, kar eridikten sonra, kışlık tahıl ürünlerinde buz kabuğu oluşması ve bitkilerin köklerinin sökülme riski için koşullar oluşacaktır.

Dönem boyunca, öngörülen sıcaklıklar sonbaharda ekilen ürünleri dormansi halinde tutacak ve meyve ağaçlarının gelişimini yavaşlatacaktır. Dönem sonunda, özellikle daha yüksek sıcaklıkların öngörüldüğü ve ortalama günlük değerlerin kışlık tahıl ürünlerinde vejetatif süreçlerin yeniden başlaması için gerekli biyolojik minimuma yakın olacağı güney bölgelerde istisnalar mümkündür.