

# Ağaçların güneş yanığı ve don zararından korunması

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 05.03.2018 Брой: 3/2018



Şubat-Mart aylarında, güneş ışınları giderek daha güçlü hale gelmeye başladığı için, gövdelerin ve ana iskelet dalların güneş yanığından korunmasına yönelik dikkat artırılmalıdır. Bu güneş yanığı, kabukta meydana gelen bir hasardır. Başlangıçta rengi değişmiş uzunlamasına bir şerit olarak görünür, zamanla çöker, ardından çatlak ve bir kanser yarası oluşur; bu, gövdenin dış ve iç katmanlarının ısınmasındaki büyük farkın sonucudur. Bu fark, aynı zamanda gün içindeki keskin sıcaklık dalgalanmalarının bir sonucu olarak da meydana gelir. Tekrarlanan maruziyetten sonra çok sayıda kanser yarası gelişir, ardından kabuk ayrılır ve yumuşak çekirdekli meyve türlerinde sözde "kabuk soyulması" meydana gelir.

Ağaçları geç kış mevsiminde güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden korumak için, gövdelerin %2,5'lik kireç badanası ile sonbaharda veya kışın zaten püskürtülmesi gerekmektedir. Bu uygulama erken ilkbaharda tekrarlanabilir.

Kış sonunda bir ısınma döneminden sonra, ağaçların tomurcuklarının donması sıklıkla gözlemlenir. Donmuş vejetatif ve çiçek tomurcukları kararır ve gelişmez; çiçek tomurcukları daha hassas olduğu için dişi organların kısmen donması da mümkündür. Kiraz, şeftali, elma ve armut soğuğa karşı özellikle hassastır. Şeftalide, tomurcukların donması çevresindeki bölgeyi de etkiler, burada reçine salgılanır ve urlar oluşur. Tüm donmuş kısımlar ağaçlardan zamanında çıkarılmalı ve yaralar yağlı boya ile kaplanmalıdır. Ağaçların badanalanması, onları ilkbahar donlarından korumada da faydalı bir etkiye sahiptir.