

Çiçeklenme Öncesi İlaçlama Zamanı

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.03.2018 Брой: 3/2018



Mart ayının üçüncü on günlük döneminde, takvim baharı başlar. Ortalama aylık sıcaklık 4-8°C'den yükselir, bulutluluk azalır ve güneşli gün sayısı artar. Isınmanın bir sonucu olarak, meyve türlerinin zorunlu dinlenme evresi sona erer ve aynı zamanda üzerlerindeki bir dizi zararlının yaşamsal faaliyeti aktifleşir. Mart ayındaki hava çok değişkendir, bu da meyve yetiştiricilerinin bahçelerde çalışmak için uygun günleri izlemesini gerektirir.

Meyve ağaçlarının tehlikeli zararlılarının kışlayan formlarının birçoğu toprakta kışı geçirir ve dökülen yapraklarda hastalık etmenleri "pusuya yatmış" halde, saldırmaya hazırdır. Bu nedenle, işlenmiş ve temizlenmiş bahçeler, zararlı riskini azaltmanın bir garantisidir. Kış ilaçlaması şu ana kadar yapılmadıysa, akarları, yaprak bitlerini ve kabuklubitleri yok ettiği için atlanmamalıdır.

Çiçek öncesi ilaçlamalar Mart ayında başlar. İlki, elmada "fare kulağı" aşamasında – külleme ve karaleke için bir fungusit ile, ikincisi ise – yine aynı hastalıklara karşı, ancak elma eşekarısına karşı bir insektisit dahil edilerek yapılır. Armutta – karaleke, armut eşekarısı, armut psillidi ve kokulu böceğe karşı. Kiraz ve vişnede – kahverengi çürüklük, yaprak delen, ateş yanıklığı, kiraz/vişne hortumlu böceğine karşı. Erik – erik eşekarısına karşı. Kayısı – kahverengi çürüklük, yaprak delen, şeftali dal kurdu. Şeftali – yaprak kıvrıcıklığı, şeftali dal kurdu.

Meyve ağaçlarının çiçek öncesi ilaçlamaları, atlanmaması gereken sorumlu bir önlemdir. Bunlar kimyasal mücadelenin başlangıcını işaret eder ve bu başlangıç, bahçedeki fitosaniter durumu tüm sezon boyunca belirler.

Bahçe ve sebze bahçesinde kimyasal kontrol için – uygulama zamanlamaları ve uygun ürünler için, "Bitki Koruma" dergisinin 2/2018 sayısını okuyun.