

Nisan ayı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.03.2018 Брой: 3/2018



Ay içerisinde, ikinci on günlük dönem için don oluşumu olasılığının artması öngörülmekte olup, bu durum sebze ve tütün fidelerinin sertleştirilmesi sırasında dikkate alınmalıdır. İkinci dönemin sonu ve üçüncü dönemin başında tarla alanlarında, 10 cm'lik toprak katmanındaki sıcaklıklar tane mısırı ekimi için uygun değerlere ulaşacak ve ayın sonunda – ayrıca sıcaklığı seven ilkbahar ürünleri (pamuk, fasulye, yer fıstığı, karpuz, kavun) için de ulaşacaktır. Nisan ayında, yüksek atmosferik nem ve sık sağanak yağışlar, bir dizi mantar hastalığının gelişimi için elverişli koşulları sürdürecektir.

İlkbahar başındaki yağışlı havanın ardından, Nisan ayının ilk on günlük döneminde mevsimlik tarımsal teknik faaliyetlerin yürütülmesi için koşullarda bir iyileşme beklenmektedir. Ülkenin birçok bölgesinde aylık normları iki kat aşan (Vidin - 135 l/m², Vratsa - 112 l/m², Lom - 119 l/m², Kneja - 104 l/m², Svishtov - 104 l/m², Şumen - 101

l/m², Dragoman - 105 l/m², Blagoevgrad - 102 l/m², Hasköy - 104 l/m², Kırcaali - 114 l/m², Elhovo - 122 l/m², Sliven - 103 l/m², Karnobat - 118 l/m²) Mart ayı yağışları, 50 ve 100 cm'lik toprak katmanlarında su birikmesine ve ekim öncesi toprak işleme ile erkenci ve orta-erkenci ilkbahar ürünlerinin ekiminde ciddi gecikmelere yol açmıştır. Bu nedenlerle, Güney Bulgaristan'da, Mart ayının ikinci yarısına denk gelen ayçiçeği ekimi için tarımsal teknik takvim süreleri kaçırılmıştır. Kuzey Bulgaristan için bu süreler Nisan ayının ilk on günlük dönemindedir. İlk on günlük dönemde, normalin üzerinde öngörülen sıcaklıklar, güz ekimi yapılan ürünlerin vejetasyonunu hızlandıracaktır. Bu dönemde tarla alanlarındaki buğday ve arpanın büyük bir kısmı sapa kalkma dönemine girecektir. Kolzada ise tomurcuklanma dönemi gözlemlenecektir.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerin çoğu gününde, tarımsal ürünlerin gelişimi, iklim normlarına yakın sıcaklıklarda orta düzeyde bir hızla ilerleyecektir. Nisan ayının ikinci yarısında, kolzada çiçeklenme dönemi gerçekleşecektir. Üçüncü on günlük dönemde, en erken (Filibe, Pazarcık) orta Mart'ta sapa kalkan buğday ve arpa başaklanma dönemine girecek ve güney bölgelerdeki bazı yerlerde ürünlerin çiçeklenme dönemi de gözlemlenecektir.

Nisan ayında beklenen ve aylık norm civarında olması öngörülen yağışlar, toprak nem rezervlerini, güz ekimi yapılan ürünlerin ve ekilen ilkbahar ürünlerinin vejetasyonu için optimal sınırlar içinde tutacaktır.

Ay içerisinde, ikinci on günlük dönem için don oluşumu olasılığının artması öngörülmekte olup, bu durum sebze ve tütün fidelerinin sertleştirilmesi sırasında dikkate alınmalıdır.

İkinci dönemin sonu ve üçüncü dönemin başında tarla alanlarında, 10 cm'lik toprak katmanındaki sıcaklıklar tane mısırı ekimi için uygun değerlere ulaşacak ve ayın sonunda – ayrıca sıcak seven ilkbahar ürünleri (pamuk, fasulye, yer fıstığı, karpuz, kavun) için de ulaşacaktır.

Nisan ayında, yüksek atmosferik nem ve sık sağanak yağışlar, bir dizi mantar hastalığının gelişimi için elverişli koşulları sürdürecektir – kışlık tahıl ürünlerinde septoryoz; meyve ağaçlarında – çiçek yanıklığı (erken kahverengi çürüklük), kabukluk, yaprak deliği hastalığı. Bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için daha uygun koşullar, ilk on günlük dönemin çoğu gününde, ikinci on günlük dönemin başında ve sonunda oluşacaktır.

Kaynak: NIMH