

Mayıs ayının ilk on gününde, toprak nem rezervlerinde bir iyileşme ve bağlarda mildiyö riski olacak.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 08.05.2018 Брой: 5/2018



Nisan sonu ve Mayıs başında yaşanan kuru ve mevsime aykırı sıcak havanın ardından, önümüzdeki yedi günlük dönemde tarımsal meteorolojik koşullar önemli bir değişim geçirecek.

İlk on günlük dönemin sonuna doğru sıcaklıklarda düşüş ve termal koşulların normale dönmesi öngörülüyor. Beklenen yaygın yağışlar, üst toprak katmanlarındaki nem rezervlerini ve ekilen ayçiçeği ile mısır ürünlerinin vejetasyonunun ilk aşamalarının ilerlemesi için gerekli koşulları iyileştirecek. Bu yağışlar, nem açısından kritik evrelerden geçen buğday, arpa ve kışlık kolza üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak. Buğday ve arpada,

başaklanma evresi kitlesel ölçekte gözlemlenecek. En erken başaklanan ürünlerde, Nisan ayının üçüncü on günlük döneminde (tarımsal meteoroloji istasyonları: Knezha, Pavlikeni, Tsarev Brod, Pazardzhik, Plovdiv, Yambol) çiçeklenme, döllenme ve tane oluşumu gerçekleşecek. Kışlık kolzada ise bakla oluşumu meydana gelecek.

Dönem içinde, asmada salkım ayrılma evresi gerçekleşecek. İlk on günlük dönemin sonundaki sık yağışlar ve daha düşük sıcaklıklar, **asmada mildiyö** enfeksiyonu ve gelişimi riskini artıracak olup, bu da hava koşulları stabil hale geldikten sonra koruyucu uygulama gerektirir. Mildiyönün ilk belirtileri görüldüğünde, sistemik fungisitlerin kullanımı zorunludur. Dönem için artan bir dolu olasılığı öngörülmektedir. Dolu hasarı durumunda, etkilenen meyve bahçeleri, yaraların mantarlaşmasını hızlandırmak ve patojenlerin neden olduğu ikincil enfeksiyon riskini sınırlamak amacıyla ilk fırsatta bakır içerikli fungisitlerle uygulanmalıdır.

Kaynak: NIMH