

'Orta Mayıs ayında mantar hastalıklarının görülme olasılığı'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.05.2018 Брой: 5/2018



Dönem boyunca öngörülen sıcaklıklar ve sık yağışlar, elma gibi yumuşak çekirdekli meyve türlerinde kabukluluk, sert çekirdekli meyvelerde yaprak deleni ve erken kahverengi çürüklük, çileklerde gri küf, asmada mildiyö vb. mantari hastalıkların enfeksiyonu ve gelişimi için koşullar yaratacaktır.

Mayıs ortasında, tarımsal meteorolojik koşullar, istikrarsız hava ve Mayıs ayının ikinci on günlük dönemi için iklim normlarına yakın sıcaklıklar tarafından belirlenecektir.

Dönem içinde beklenen yağışlar, 50 cm'lik toprak katmanındaki nem rezervlerini ve sonbaharda ekilen ürünler ile ekilen ilkbahar ürünlerinin gelişim koşullarını iyileştirecektir. Mayıs ayının ilk on günlük döneminin sonunda

meydana gelen yağışlar düzensiz dağılmıştır. Tarla alanlarının bazı yerlerinde, ekonomik açıdan özel bir önemi olmadan, yağış 10 l/m²'nin altında kalmıştır. Tuna Ovası'nın bazı bölgelerinde ve Doğu Bulgaristan'da 25-30 l/m²'nin üzerinde önemli miktarlar ölçülmüştür. Stara Zagora bölgesinde, 50 l/m²'nin üzerindeki sağanak yağış, kışlık tahıl ürünlerinin bir kısmında yatmaya neden olmuştur.

Dönem boyunca ayçiçeği ve mısırdaki yaprak oluşumu gerçekleşecektir. Kışlık tahıl ürünlerinde çiçeklenme, dölllenme, tane oluşumu ve tane dolumu gerçekleşecektir. İkinci on günlük dönemin sonunda, güney bölgelerdeki arpa ve buğday ekilişlerinin bir kısmı, ülke için alışlagelmiş tarihlerden daha erken olarak süt olumu aşamasının başlangıcına girecektir. Kışlık kolza, gelişiminin üreme aşamasındadır.

Dönem boyunca öngörülen sıcaklıklar ve sık yağışlar, elma gibi yumuşak çekirdekli meyve türlerinde kabukluluk, sert çekirdekli meyvelerde yaprak deleni ve erken kahverengi çürüklük, çileklerde gri küf, asmada mildiyö vb. mantari hastalıkların enfeksiyonu ve gelişimi için koşullar yaratacaktır.

Mayıs ayının ikinci on günlük döneminde, erkenci kiraz çeşitlerinde olgunlaşma aşaması gözlemlenecektir. Bu dönemde, kiraz sineği orta-erkenci çeşitlerde zarara neden olmaktadır. Bu zararlıya karşı insektisit uygulaması, kiraz meyvelerinin renklenmeye başladığı dönemde yapılmalıdır.

Kaynak: NIMH