

Kiraz sineği (*Rhagoletis cerasi* L.)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.05.2018 Брой: 5/2018



Bu, kirazın ekonomik açıdan en önemli zararlısıdır. Sineklerin uçuşu, toprak sıcaklığı yaklaşık 10°C olduğunda başlar. Çıkış, en erkenci kiraz çeşitlerinin olgunlaşması ile çakışır. Zararlı, olgunlaşmaya başlamış meyvelere yumurtalarını bırakır. Zarar, meyvenin etli kısmıyla beslenen larva tarafından oluşturulur. Zarar gören meyveler kararır, çürür ve hasarın olduğu yerde çöker. Kurtlu meyveler tüketime uygun değildir.

Zararlı mücadele stratejisi:

Kiraz sineği mücadelesi için en uygun zamanlamayı belirlemek amacıyla, erkenci kiraz çeşitlerinin bulaşmasından önce yerleştirilen kombine tuzaklar kullanılabilir. Kiraz sineği mücadelesi, yumurta bırakmadan önce ergin böceğe karşı yönlendirilir, bunun için sineğin uçuşunun başlangıcının tuzaklar yardımıyla tespit edilmesi çok önemlidir.

Kiraz sineğinin kimyasal mücadelesi, yumurta bırakmadan önce erginlere karşı, uçuşun başlamasından yaklaşık 10–12 gün sonra gerçekleştirilir.

Yetkili bitki koruma ürünleri:

Vaztak New 100 EC – %0,015; Decis 2.5 EC – %0,03; Decis 100 EC – 10–17,5 ml/da; Eforia 045 ZC – 150 ml/da; Calypso 480 SC – %0,02; Karate Express WG /Ninja /Forza – 60–100 g/da; Karate Zeon 5 CS – 15 ml/da; Naturalis – 100–200 ml/da; Fury 10 EC – %0,0125.