

'Haziran ayında da bahçede bitki koruma faaliyetleri devam ediyor'

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 07.06.2018 Брой: 6/2018



Haziran ayında ortalama aylık sıcaklık ova bölgeleri için 18-22°C, yüksek alanlar için ise 11-16°C arasındadır.

Bu aydaki yağış miktarı metrekare başına 60 ila 90 litre arasında değişir.

Haziran ayında kiraz, vişne ve çileklerin yanı sıra ahududu, kayısı, şeftali, armut ve elmanın erkenci çeşitleri de yoğun şekilde olgunlaşır. Meyve ürünlerinin ve ağaçların korunmasına yönelik bakım işlemleri devam eder.

Haziran ayında, **elma** ağaçlarına karşı külleme ve kara lekeye, elma içkurdu, San Jose kabuklubiti ve yaprakbitlerine karşı ilaçlama devam eder. **Armut** ağaçları için ise kara leke, beyaz ve kahverengi yaprak lekesi ile armut psillidine karşı mücadele sürdürülmelidir.

Ayva ağaçları için ise monilya (mumya) hastalığı ve meyve kurduna karşı ilaçlama yapmak gereklidir.

Haziran ayında, **armut, ayva ve elma ağaçlarını ateş yanıklığından koruma** bakımı devam eder. Zararı sınırlamak için, enfekte olmuş dallar ve sürgünlerin çıkarıldığı sanitasyon budaması yapılır (enfeksiyon noktasının 30-40 santimetre altından kesilir), ardından yaraların üzerine bakır içerikli ürünlerin (Bordo bulamacı 20 WP, Bordo karışımı, Funguran OH 50 WP, Champion WP gibi) eklendiği yağ bazlı boya sürülür. Budama aletleri her kesimden sonra metil alkol ile veya suyla 1:10 oranında seyreltilmiş çamaşır suyunda dezenfekte edilir. Budamaya ek olarak, ağaçları enfeksiyondan korumak için şunlarla ilaçlama da yapılır: %1'lik Bordo bulamacı, %0.15'lik Funguran OH 50 WP, %0.15'lik Champion WP. Hastalığın gelişimi için uygun koşullarda (hassas çeşitlerde, serin ve nemli havalarda ve Mayıs ayında kontrol altına alınamamış bir enfeksiyon varlığında), koruyucu ilaçlama 5-7 gün aralıklarla yapılır.

Orta ve geç olgunlaşan kiraz çeşitleri ile vişnelerin Haziran başında silindrosporioz (beyaz pas), monilya (mumya) hastalığı ve kiraz sineğine karşı korunması gerekir.

Şeftali için külleme, yaprak delen, monilya, Anarsia, doğu meyve güvesi ve yaprakbitlerine karşı ilaçlama devam eder.

Küllemeye karşı aşağıdaki fungusitlerden biri kullanılır:

Ahududu için Haziran başında didimella, antraknoz, kamış yanıklığı (leptosphaeriosis), kurşuni küf, ahududu oyucu böceği, ahududu gal sineği ve ahududu böceğine karşı ilaçlama yapılır.

Meyve bitkilerinde hastalık ve zararlılara karşı yapılan ilaçlamaların etkili olabilmesi için zamanında ve kaliteli bir şekilde yapılması gerekir. Ayrıca, belirli bir ilaçlamanın gerekliliğini belirlemek, bu da zararlı popülasyon yoğunluğunu tespit etmek için yapılan spesifik izleme ile ilişkili olup, ekonomik zarar eşikleri aşıldığında ilaçlamaya başlamak da çok önemlidir.

Kullanımına izin verilen fungusit ve insektisitler hakkında bilgi, “Bitki Koruma” dergisinin 5/2018 sayısında bulunabilir.