

# Bağlarda ve sebze bitkilerinde mildiyö enfeksiyonu tehlikesi

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 19.06.2018 Брой: 6/2018



Geçmiş dönemde tarımsal meteorolojik koşullar, yerel sağanaklarla birlikte dengesiz – sıcak, hatta sıcak hava ile belirlendi.

15-21 Haziran döneminde hava dengesiz olmaya devam edecek, sık sağanaklar bekleniyor ve sıcaklıklarda düşüş olacak. Dolu ve tarımsal ürünlere zarar olasılığı devam ediyor.

Tahmin edilen meteorolojik koşullara göre, ilkbahar ürünlerinin su ihtiyacı, üreme gelişim aşamasına geçişleri nedeniyle dönemin ikinci yarısında önemli ölçüde artacaktır. En yüksek değerler Güneybatı ve Güney

Bulgaristan'ın tüm orta kesimindeki tarlalarda olacak ve dönem için maksimum 36-40 mm'ye kadar değerlere ulaşacaktır.

Sık sağanaklara rağmen, ülke genelinde toprak nem rezervlerinde çeşitli derecelerde açık gözlemlenmektedir. Su açığı değerleri kuzeydoğudan güneybatıya doğru giderek artmakta ve maksimum 20-26 mm'ye kadar değerlere ulaşmaktadır.

Kışlık tahıl ürünlerinde süt, hamur ve tam olgunluk aşamaları gözlenecektir. Ayçiçeğinde yaprak oluşumu ve tomurcuklanma, mısırdaki ise yaprak oluşumu gerçekleşecektir. Köklenen toprak katmanında su rezervlerinin optimumun altında olduğu alanlarda sulamaya başlanmalıdır.

Bu dönemdeki meteorolojik koşullar, bağlarda ve sebze ürünlerinde mildiyö enfeksiyonu riskini de sürdürecektir. Doğu meyve güvesi meyve türlerine zarar vermeye devam edecektir. Ayrıca meyvelerde külleme ve kabuk lekeli gelişme riski de vardır. Mayıs sonu ve Haziran başındaki sıcak ve kuru hava, yaprak biti popülasyonlarının çoğalmasında ve artmasında destekledi. Domateslerde, yaprak bitleri tarafından bulaştırılan nekroz (kararma) zarara neden olur, bu da vektörün kontrolünü gerektirir. Etkilenen bitkiler sökülür ve uzaklaştırılır.

Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama için uygun koşullar, yağış olasılığının azalmasının beklendiği dönem sonuna doğru ortaya çıkacaktır.

*Kaynak: NIMH*